পাইরোক্লাস্ট্রোবিন ১০০ গ্রাঃ/লিঃ সিএস

সেলটিমা™

ত্বরকনাশক

পাইরোক্লাস্ট্রোবিন ১০০ গ্রাঃ/লিঃ সিএস (সেলটিমা) হচ্ছে ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্য ধানে ব্যবহৃত অত্যন্ত প্রভাবশালী ত্বরকনাশক।

রাসায়নিক সংজ্ঞাঃ

ক্র. নং.	উপাদান	ওজন/পরিমাণ (গ্রাঃ/লিঃ)
১.	পাইরোক্লাস্ট্রোবিন সহ উঃ	১০০
২.	অ্যানকরপল, সিঃ-১০, ইথাইলেনডাইন গ্লাইকলেটেড	১০০
৩.	অ্যালকাইল হাইড্রোকার্বন, বাণিজ্যিক মিশ্রণসহ	১০০
৪.	ট্রাইইথেন	৫০
৫.	অইয়োনাসমৃদ্ধতেজে ফেরফাতিজাইন ডিসাইলেনোমাসাইট থিক্সিক পলিমারাইজেশনের	৭৮.৮
৬.	অ্যানকরপল, সিঃ২-১৮, ইথাইলেনডাইন গ্লাইকলেটেড	৬৭.৯
৭.	এল-গ্লুটামিক অ্যাসিডোলাইটি	১১.৩
৮.	সোডিয়াম সিলেনোলেনেটেট	৯.৮
৯.	হিমিথাইসিন ট্রিয়ারাইন	৭.৩
১০.	সিলিকন ডাইঅক্সাইড, বাণিজ্যিকভাবে প্রাপ্ত	৫
১১.	পলিগ্রাভকরাইড	২.৫
১২.	১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলিন-৩-অন প্লাস ২-মিথাইল-৪-আইসোথিয়াজোলাসিন-৩-অন	২
১৩.	সিলিকন অপিয়েসন	২
১৪.	সাইট্রিক অ্যাসিড মোনোহাইড্রেট	২
১৫.	জল	যথেষ্ট পরিমাণ
	মোট	১০০০.০

দ্রবণ ঃ ১.০৫ গ্রাঃ/লঃ সোচ্চি

ব্যবহারের জন্য প্রয়াণ ও সুপারিশ: নিম্ন দেওয়া সুপারিশ অনুসারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পাইরোক্লাস্ট্রোবিন ১০০ গ্রাঃ/লিঃ সিএস ধানের ফলনে কলনে রোগের প্রভাবশালক নিয়ন্ত্রণে প্রদান করে।

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর			অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সং উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	জল (লিঃ)	
ধান	ঝলসা	১০০	১০০০	৫০০	১৮

প্রয়োগের সময় এবং ফলনের পর্যায়: রোগের প্রথম লক্ষণটি পরিলক্ষিতের পর্বে প্রতিরোধমূলক প্রয়োগ। সক্রিয় কলের উদ্ভাসের সময় চুলাকরার পর্যায় চলাকালীন প্রয়োগ করবেন।

আবহাওয়ার অবস্থাঃ সকালে বা বিকেলে প্রয়োগ করলেই ভালো হয়। প্রাতঃ ঘাসবার মধ্যে এবং ১ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে প্রয়োগ এড়াতে হবে।

মাটি: এটি পানায় প্রয়োগের জন্যে সুপারিশকৃত। মাটি প্রকার কোনও বিশেষ সুপারিশ নেই।

প্রয়োগ কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজলের প্রকার : ফলনের আগেপরান্ত ফসলের সুনিশ্চিত কভার, সুপারিশকৃত অনুযায়ী পরিমাণ ব্যবহার করে, হাতে কোন নজল সহযোগে সরঞ্জামকৃত প্রাণীত ব্যাকপাক দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে

ঘাত্রা : প্রতিটি সিজু ১০০ মিলিলিটার ঘথেষ্টলিটার।

দোগোরক অন্যে নির্দেশ : ১. উৎপাদনে প্রয়োগকারীর পরিমান মেপে নিন এবং অন্য কোনো অতিরিক্ত মেপে নেবেন না। অবশিষ্ট মিশ্রণ যেন আশপাশে ফেলাবেন না। ২. ব্যবহার শেষান্তে ভালো করে ধোয়া ফসলিশপাক ওষধ পরিশেষণবিধির সুরক্ষা জন্যে কাপড়সুদ্ধতে অন্যথায় রাখতে অবিলম্বে ধোয়ান করুন।

কীটনাশক, সার বা ত্বাকনাশক সমন্বিত সংরাহকের সঙ্গে মোগানো অন্যে সুপারিশকৃত নয়।

পুনঃ প্রবেশের সময়কাল : মোহ প্রবর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার পরে।

শিশুইফেক্টি : ১৮ দিন

প্রয়োগের সময় : প্রোথেসাক্লিক হিসাবে উৎপন্ন প্রয়োগিত হতে পারবে। সকালে ও বিকেলে প্রয়োগ করলেই ভালো হয়।

যেসব কথার সর্বাধিক ব্যবহৃত কারণাবার : ১০-১২ দিনের ব্যবিরতে যেসে কথালে, কেবে মধ্যম শিশু শুকনো স্প্রেতর থেকে এলো নয়। কার্যক্রিয়ার সময়কাল ধরণ সহযোগে পরপর যেসে কথা ধারাবাহিক হয়ে উঠিয়া সচুইত।

যে পর্যায়ক্রমগুলো চলাকালীন কোনও ফসলের ওপর ত্বাকনাশক প্রয়োগিত হবেই না : কৃষ কালের প্রাথমের পূর্বে এবং ফুলধারণ পরে ব্যবহার হবেই না।

এই নেমেন / সিমলেটে মিশ্রোষিত ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহার হবে না।

আলাদা জীবাণুর প্রতি বিষক্রান্ত, ডাবি আগ্রহান বা বাছাইয়ের এলাকার নিকটে ব্যবহার হবেই না।

মধুফুলকরের অবহার :

১. ঘাত্রাকলাপ সর্বদিক পাক্ষ অন্যান্য পর্ণার মধুফুলের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা ক্ষন মেকে দূরে পুষক পুষক ঘর বা ক্ষন মধুফুল করতে হবে অথবা পুষক আলমরিতে তাদের কক্ষ করে রাখতে হবে।

২. ত্বাকনাশক মধুফুলকরাদের ঘর বা হানটি হাতে হবে সুনিশ্চিত, শুকনো, সুগন্ধমাহিত, বাতাসিত এবং কণ্ডলরূপ ঘরে প্রয়োগের ধরণের পরাক্ষ পরিবর্তন করুন।

সুরক্ষা সাবধানতা :

১. মেরেকাদে বা ফলনকালের কালদে অকেশিকরণের সময়ে শ্বাসে ফাতরা বা ক্ষুকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। পানি হাত মিশে বা মেশানোর না।

২. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করতে হবে, যাতে সাজিল থাকবে কালাজর হাতমোজা, বুটজুতো, পুরোদস্ত লম্বা আস্তরাবরণ বা ওভারঅল আস্তর এবং টুপি।

প্রাথমিক চিকিৎসা : সিপে মেলাসে : ত্বকি সংস্পর্শে ও সংক্রর পাকলে, জলে সিয়ে মধ্যে ধুইয়ে মেলেন এবং ১ বা ২ মেলাসে ভরা পাক ব্যবহার মেলেন। আক্রান্ত ত্বকিকে সাবানসহ ধুয়ের মতো মেলাসিধুয়ে মেলেন না। ত্বকের মেলাসের উপরিষ্ট থাকে ব্যবহারে হিসে না থাকা পর্যন্ত বমি করাতে চাইবেন না। **শ্বাসে গেলে :** মেলাসিকে মুক্ত বাতুসের সরিয়ে মেলেন এবং শরীরের আপনারার প্রতি যত্ন নেবেন। মেলাসি শ্বাস না নিলে বা কষ্ট করে শ্বাস নিলে, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস করাবেন, মুখ সিয়ে শ্বাস মেলাস হলে আরো মন্দ। চিকিৎসকের পরামর্শ মেলেন। **ত্বকের সংস্পর্শে মেলে :** সাবান ও প্রচুর জল সিয়ে ত্বক মেলে ধুয়ে, দূষিত পোশাক ও জুতো খুলে ফেলুন। **চোখের সংস্পর্শে মেলে :** সরাসরি সূর্যের পোশাক এবং বারবার করার পর্যন্ত পানি মেলে ধুয়ে মেলেন। **চোখের সংস্পর্শে মেলে :** অন্যান্য ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে ধাকাতারে চোখ মেলে ধুয়ে, অন্তত, লাগতারার বা কন্টাক্ট লেন্সগুলো সরিয়ে মেলে চেষ্টা করুন এবং ধুয়ে মেলুন, লাগতারার বা কন্টেক্টলেন্সগুলো সহজে আলাদা না হলে, চিকিৎসকের সঙ্গে আলোনা করুন।

চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ : চিকাকারক ক্ষেত্রে লক্ষণমূলক চলাই প্রয়োগ করুন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট মেলাসও প্রতিষেধক জানা নেই।

সতর্কীকরণ : যাদি পাওয়ানি পুনর্ব্যবহার করা নিষিদ্ধকরণ।

ব্যবহার-পরবর্তীকাল নিষ্পত্তির বিধিনিষেধ :

১. পাত্রকলাগুলো বা ডিব্বে পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি যোগাদি ব্যবসায়ী এমন নিয়ন্ত্রণ উপায়ে নিষ্পত্তিকরে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের মধ্যে দূষণ প্রতিরোধ হয়।

২. ব্যবহৃত পাত্রকে পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যাতকর ভেঙ্গে রাখানো না।

৩. পাত্র ভেঙ্গে দেওয়াদির পরে মৃত্তিকা ভেঙ্গে ফেলুন।

নির্যাতার নাম : বিএসকেএম এগ্রোকেমস এন্ড.এল., পলিমাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যাদ ডিলনেগর, ৩৮৭৩২ ক্যাসমাইবিয়ারা।স্পেন

প্রস্তুতকারি, পুনঃ প্যাক এবং বিপণনকারী : বিএসকেএম ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস.এ., পলিমাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যাদ ডিলনেগর, ৩৮৭৩২ ক্যাসমাইবিয়ারা।স্পেন

প্রস্তুতকারি, ই-ল্যাবেলদাতা ও উপ্রোক্ত : বিএসকেএম ইন্ডিয়া প্রাইভেট। **বিক্রির ধার্যোগ্যতা :** ৩১ বাজার, বিক্রয়ের তারিখ, ৫ বছর, ব্যাচ-কুলী কমাত্রার বাজার (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১. **কারখানা :** ইউনিট নং. ৪, প্লাট-বিল্লাপুর, গ্রোথ আ-মুরাকলপুর-১৪৯২০১, মধ্যপ্রদ- দেহ বাসাই, জেলা- ভোপাল, পাত্রাদি।

Bengali

ପାରାକ୍ୱାଟ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧୦୦ ଗ୍ରା/ଲି ଏସ୍‌ଏଲ୍

ସେଲ୍‌ଟିମା™

(ଟିମିନାଶକ)

ପାରାକ୍ୱାଟ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧୦୦ ଗ୍ରା/ଲି ଏସ୍‌ଏଲ୍ (ସେଲ୍‌ଟିମା) ହେଉଛି ଧାନ ପରବରେ ମାତ୍ରା ରେ ବିଷାକ୍ତ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିମିନାଶକ।

ରାସାୟନିକ ବର୍ଣ୍ଣନା :

କ୍ର. ନଂ.	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ/ଓଜନ (ଗ୍ରା/ଲି)
୧.	ପାରାକ୍ୱାଟ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁ.ଜି.	୧୦୦
୨.	ଆକ୍ରାଇଲୋନାଇଟ୍, ସି୧-୧୦, ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରପୋନାଇଲେଟେଡ୍	୧୦୦
୩.	ଆରୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ମିଶ୍ରିତରେ ଓ ମିଶ୍ରିତ	୧୦୦
୪.	ଟ୍ରାଇଇଥେନ	୫୦
୫.	ଆକ୍ରାଇଲୋନାଇଟ୍ରାଇଲେଟର ପେଟ୍ରୋକୋପିଲିମିଟିର ବାଇପାରୋକ୍ସାନାଲେଟ୍ ଥିକ୍ସିଟ୍ରପିକ ପଲିମାରାଇଜେସନ୍‌ଟର	୭୮.୮
୬.	ଆକ୍ରାଇଲୋନାଇଟ୍, ସି୧-୧୮, ଇଥୋକ୍ସିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରପୋନାଇଲେଟେଡ୍	୬୭.୯
୭.	ଏଲ୍-ଗ୍ଲୁଟାମିକ୍ ଏସିଡ୍‌ଡାଇଏସିଟେଟ୍	୧୧.୩
୮.	ସୋଡିୟମ୍ ସିଲେନୋଲେନେଟେଟ୍	୯.୮
୯.	ହାଇମିଥାଇସିନ୍ ଟ୍ରିଆରାଇନ୍	୭.୩
୧୦.	ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ	୫
୧୧.	ପଲିଗ୍ରାଭକରାଇଡ୍	୨.୫
୧୨.	୧,୨-ବେଞ୍ଜିସୋଥିଆଜୋଲାଇନ୍-୩-ଅନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୨-ମିଥାଇଲ୍-୪-ଆଇସୋଥିଆଜୋଲାଇନ୍-୩-ଅନ୍	୨
୧୩.	ସିଲିକନ୍ ଆଣ୍ଟିଫୋମ୍	୨
୧୪.	ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୋନୋହାଇଡ୍ରେଟ୍	୨
୧୫.	ଜଳ	ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ
	ମୋଟ	୧୦୦୦.୦

ଦ୍ରବଣ ଃ ୧.୦୫ ଗ୍ରା/ଲିଟର

ପ୍ରୟୋଗ ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସୁପାରିଶ: ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାରରେ ସେତେବେଳେ, ପାରାକ୍ୱାଟ୍ ଡାଇକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧୦୦ ଗ୍ରା/ଲିଟର ସେଲ୍‌ଟିମା ଧାନରେ ଫସଲର କଳାର ରୋଗର ପ୍ରଭାବଶାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଫସଲ	ରୋଗର ଇଂରାଜୀରେ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର			ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନ)
		ଶୁ.ଉ. (ଗ୍ରା)	ଫର୍ମୁଲେସନ (ମି.ଲି.)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ଧାନ	ଝୁଲସା	୧୦୦	୧୦୦୦	୫୦୦	୧୮

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ ଏବଂ ଫସଲର ପର୍ଯ୍ୟାୟ : ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିଲକ୍ଷିତରେ ପର୍ବେ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପ୍ରୟୋଗ। ସକ୍ରିୟ ରୋଗର ଉଦ୍ଭାସରେ ସମୟ ଚୁଲାକରାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚଳାକାଳିନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ।

ବ୍ୟବହାରରେ ଆବହାୱା : ସକାଳେ ବା ବିକେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ। ପ୍ରାତଃ ଘାସବାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ୬ ଘଣ୍ଟିରେ ବୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ପ୍ରୟୋଗ ଏଡ଼ାଇବ ହେବ।

ମାଟି: ଏଟି ପାଣାର ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ। ମାଟି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁପାରିଶ ନାହିଁ।

ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ, ସରଞ୍ଜାମର ପ୍ରକାର, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାର : ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରାରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ସୁପାରିଶକୃତ ପରିମାଣ ପରିମାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାତ କୋଣ ନଜଲ ସହଯୋଗ ସରଞ୍ଜାମକୃତ ପ୍ରାଣିତ ବ୍ୟାକପାକ ମିଶ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ

ମାତ୍ରା : ପ୍ରତିଟି ସିଜୁ ୧୦୦ ମିଲିଲିଟର ଯଥେଷ୍ଟଲିଟର।

ମୋଗାରର ଅନ୍ୟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ୧. ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରୟୋଗକାରିର ପରିମାଣ ମେପେ ମିନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋନସେରେ ମେପେ ନେବେନ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ ଯେପେ ଆଶପାଶରା ଫେଲାଦାରୁ କରୁନା। ୨. ବ୍ୟବହାର ଶେଷାନ୍ତେ ଧୋୟାନ ଏବଂ ସେରା ଜାମାକାପଡ଼ସମ୍ଭାର ଓକ୍ତା ପରିଦେଶାଳିନର ସୁରକ୍ଷା ଜନ୍ୟେ କାପଡ଼ସୁଦ୍ଧତେ ଅନ୍ୟଥାରା ରାଖତେ ଅବିଲମ୍ବେ ଧୋୟାନ କରୁନ।

କୀଟନାଶକ, ସାର ବା ତ୍ୱାକନାଶୁକ ସମ୍ବଳିତ ସଂରାହକର ସଙ୍ଗେ ମୋଗାରର ଅନ୍ୟେ ସୁପାରିଶକୃତ ନୟ।

ପୁନଃ ପ୍ରବେଶର ସମୟକାଳ : ସ୍ପ୍ରେ ଶୁକ୍ଳ ଶୁକିୟା ସାରାରର ପରେ।

ଶିଶୁରିଫେକ୍ଟି : ୧୮ ଦିନ

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ : ପ୍ରୋଥେସାକ୍ଲିକ ହିସାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗିତ ହତେ ପାରବେ। ସକାଳେ ଓ ବିକେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ଭଲରୁ ହୋଇ ଥାଏ।

ଯେଉ କଥାର ସର୍ବାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହର କରାଯାବାର : ୧୦-୧୨ ଦିନର ବିରତିରେ ଯେଉ କରାଯେ, କେବେ ମଧ୍ୟମ ସିଜୁ ଶୁକ୍ଳର ସ୍ପ୍ରେତର ଥେକେ ଏଲୋ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟାର ସମୟକାଳ ଧରଣ ସହଯୋଗ ପରପର ଯେଉ କଥା ଧାରାବାହିକ ହୋଇ ଉଠିବାରୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଚଳାକାଳିନ କୌଣସି ଫସଲର ଓପର ତ୍ୱାକନାଶକ ପ୍ରୟୋଗିତ ହବେ ନାହିଁ : ଫଳ ଗଠନର ଆରମ୍ଭରୁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଫୁଲଧାରଣ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହବେ ନାହିଁ।

ଏହି ଫସଲ / ମିସଲମାନ ସିଆରେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର ହବେ ନାହିଁ।

ଆଲଗ ଜୀବାଣୁର ପ୍ରତି ବିଷାକ୍ତ, ଓଟି ଆଗ୍ରହାନ ବା ବାଛାଇରେ ଏଲାକାର ନିକଟରେ ବ୍ୟବହର ହବାରି ନାହିଁ।

ମଧୁତୋଷକରର ସତର୍କତା :

୨. ତ୍ୱାକନାଶକ ମଧୁତୋଷକାରୀ ଘର ବା ହାନ୍ଦି ହାତେ ହବ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନତା :

୧. ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଏବଂ ଫସଲ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜୋତା, ଗୁଣ୍ଡ ବା ଚଷମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଚର୍ମରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଜାରି ରହେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇଲେ ବମି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।

ପ୍ରତିଷେଧକ : ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ।

ସତର୍କୀକରଣ : ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ।

ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକରଣ :

୧. ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଔଷଧକୁ ଏପରି ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ନହେବ।

୨. ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ।

୩. ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ।

ନିର୍ମାତାର ନାମ : ବିଏସକେଏମ ଏଗ୍ରୋକେମ ଏଲ.ଏଲ., ପଲିମସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟାଲ ସାନ ଡିଲନେଗ୍ରୋ, ୦୬୮୨୨ କାସମାଇବିୟାରା।ସ୍ପେନ

ପ୍ରସ୍ତୁତକାରି, ପୁନଃ ପ୍ୟାକ ଏବଂ ବିପଣନକାରୀ : ବିଏସକେଏମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟାଲ ଏସ.ଏ., ପଲିମସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟାଲ ସାନ ଡିଲନେଗ୍ରୋ, ୦୬୮୨୨ କାସମାଇବିୟାରା।ସ୍ପେନ

ପ୍ରସ୍ତୁତକାରି, ଇ-ଲେବେଲଦାତା ଓ ଉତ୍ପାଦକ : ବିଏସକେଏମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। **ବିକ୍ରୟର ଯୋଗ୍ୟତା :** ୩୬ ବଜାର, ବିକ୍ରୟର ତାରିଖରୁ, ୫ ବର୍ଷ. ବ୍ୟାଚ୍-କୁଲି କମାତ୍ରାର ବଜାର (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବଇ-୪୦୦୦୫୧. **କାରଖାନା :** ୟୁନିଟ ନଂ. ୪, ପ୍ଲାଟ-ବିଲ୍ଲାପୁର, ଗ୍ରୋଥ ଆ-ମୁରାକଲପୁର-୧୫୨୦୨୧, ମଧ୍ୟପ୍ର- ଦେହ ବାସାଇ, ଜେଲା- ଭୋପାଲ, ପାତ୍ରାଦି।

Oriya

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 100 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಸ್‌ಎಲ್

ಸೆಲ್ಟಿಮಾ™

ತಿಲೀನಾಶಕ

ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 100 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಸ್‌ಎಲ್ (ಸೆಲ್ಟಿಮಾ) ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂತಹ ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ/ವಿ (ಗ್ರಾ/ಲೀ)
1.	ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರ್ ಟೆ. ಪ್ರ.	100
2.	ಆಕ್ರೈಲೋನಿಟ್ರೈಲ್, C8-10, ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಪಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್	100
3.	ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಶಾಖಭೇದಿ ಪ್ರಿಪೇರೆಟ್ ಮಿಶ್ರಣ	100
4.	ಟ್ರೈಎಥೇನ್	50
5.	ಪಾಲಿಥೈಲೀನಾಮಿನ್‌ಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕೃತ ಹೆವಿ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಫ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನೋಲ್‌ಗಳ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಲಿಗೋಮರ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಪೊಲಿಮರೀಕರಣದ ಉತ್ಪನ್ನ	39.8
6.	ಆಲ್ಕೈಲಾಮೀನ್, C12-18, ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಪಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್	37.6
7.	N-ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಅಸಿಟಾಕಿನೈಡ್	11.3
8.	ಮೀಥೈಲೀನ್ ಬಿಸ್‌ಥಿಯೋಸೈನೇಟ್	9.8
9.	ಬೆಂಜಲ್ಕೋನಿಯಮ್ ಬ್ಯೂಟಾಮೈಡ್	7.5
10.	ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೀಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್	5
11.	ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಫಿಲ್	2.5
12.	1,2-ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನೆ-3-ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 2-ಮೀಥೈಲ್-4-ಐಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ್-3-ಒನ್	2
13.	ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಂಟಿ-ಫೋಮಿಂಗ್	2
14.	ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಆಸಿಡ್ ಮೋನೋಹೈಡ್ರೇಟ್	1
15.	ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ	ಪ್ರತಿ.ಪ.
	ಮೊತ್ತ	1000.0

ಅ.ಚಟ್ಟಿ :- 1.05 ಕಿಗ್ರಾ/ಲೀ

ದಿನಬಳಕೆಯ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥೂಲ: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಡೈಕ್ಲೋರೈಡ್ 100 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಸೆಲ್ಟಿಮಾ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳ ವಿವರಗಳು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್			ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
	ಹೆಸರು	ಶು.ಪ್ರ. (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರು (ಲೀಟರ್‌ಗಳು)	
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿ ರೋಗ	100	1000	500	18

ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ: ಕಳೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮಣ್ಣು: ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಫಾರಸು ಇಲ್ಲ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ, ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಧಗಳು, ನಳಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು : ಕಳೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ತ