FLUXAPYROXAD 333 G/L FS
Systiva®
(Fungicide for seed treatment)
Read Leaflet before use

Systiva contains 333 g/l of Fluxapyroxad. It is very effective as a seed treatment fungicide to control Anthracnose disease in Sorghum, Rhizoctonia root rot and Cotyledonary spot in Soybean and Seedling disease (Rhizoctonia) in Cotton.

Chemical Composition:

S. No.	Ingredient	Content w/v (g/l)
1	Fluxapyroxad a.i.	333
2	Propan-1,2,3 triol	101
3	C.I. pigment red 48:2 (2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-hydroxy-, calcium salt (1:1)	50
4	Acrylic graft copolymer in water and propylene glycol	41
5	Ammonium salt polyarylphenyl ether sulfate	25
6	Polydimethylsiloxane + filler, emulsion in water	5.4
7	1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3- one in aqueous solution	3.7
8	Xanthan gum	2.2
9	Sodium hydroxide	0.3
10	Fully de-ionized water	q.s.
	Total	**1000.00**

Density: 1.16 g/ml.

Application & Recommendation for use: When used as per the recommendations given below as a seed treatment, Fluxapyroxad 333 g/l FS provide good control of Anthracnose disease in Sorghum, Rhizoctonia root rot and Cotyledonary spot in Soybean and Seedling disease (Rhizoctonia) in Cotton.

Crop	Common name of Disease	Dosage / kg of seed			Waiting Period (Days)
		a. i. (grams)	Formulation (ml)	Quantity of Water required to Make Slurry (ml)	
Sorghum	Anthracnose	0.33	1.0	Sufficient to coat the seeds uniformly	N.A. (Seed Dresser)
Soybean	Rhizoctonia root rot, Cotyledonary spot	0.33	1.0	Sufficient to coat the seeds uniformly	N.A. (Seed Dresser)
Cotton	Seedling Disease	0.49	1.5	Sufficient to coat the seeds uniformly	N.A. (Seed Dresser)

Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

The product is toxic to aquatic organisms. Avoid use near water bodies.

Time of Application and crop stage: Fluxapyroxad 333 g/l FS is a fungicide used as seed treatment before sowing the crop.

Weather conditions: Weather condition has no impact on application.

Soil: Maintain good soil moisture for germination of treated seeds.

Application technique, equipment type, nozzle type: For small lots, mix the required quantity of the product Fluxapyroxad 333 g/l FS with water sufficient to coat the seeds uniformly. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (drum / plastic bag) until the seeds are uniformly coated (usually less than a minute). Fluxapyroxad 333 g/l FS can also be used as slurry for application with continuously operating commercial seed dressing Equipments.

Dosage: 1.0 ml of formulation per kg of seed in Sorghum and Soybean; 1,5 ml of formulation per kg of seed in Cotton.

Instruction for mixing: For small lots, mix the required quantity of the product Fluxapyroxad 333 g/l FS with water sufficient to coat the seeds uniformly. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (drum / plastic bag) until the seeds are uniformly covered (usually less than a minute).

Re-entry period: Not applicable.

PHI: Not applicable.

Application timing: It is used as seed treatment before sowing.

Frequency including maximum number of sprays: Seed treatment only once before sowing.

Stages during which fungicide should not be applied on any crop: It is a seed treatment product and should not be applied as foliar application.

Storage: 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almiraha under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Safety Precautions: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat.

Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of dyspnoea and cowering.

First Aid: Remove contaminated clothing. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air, and seek medical attention. On skin contact, wash thoroughly with soap and water. On contact with eyes, wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. On ingestion, immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Advice to Physician: In case of poisoning apply symptomatic therapy.

Antidote: No specific antidote is known.

Warning: Dangerous to reuse empty containers.

Safe Disposal of Used Containers: 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Manufactured by: BASF Agri-Production S.A.S., Zone Industrielle Lyon Nord, Rue Jacquard, 69727 Genay Cedex, France.
Imported, Re-packed and Marketed by : BASF India Limited, Registered office: Plot No. 37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (East), Mumbai - 400072, India.
Factory: Unit No. 4, Village Nimbua, P. O. Mubarakpur, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab - 140201.

English

फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली एफएस
सिस्टिवा™
(बीजोपचार के लिए फफूँदनाशक)
प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले

सिस्टिवा में 333 ग्रा/ली. फ्लुक्सापायरोक्साड है। यह जौवार में एन्थ्राकनोज़ रोग,सोयाबीन में रायजोक्टोनिया जड सडन और बीज पत्र के धब्बे तथा कपास में बीज रोग (रायजोक्टोनिया) की रोकथाम के लिए एक बहुत ही असरदार बीज उपचार फफूँदनाशक है।

रासायनिक घटक :

क्रम सं.	तत्व	अंश भा/आ (ग्रा/ली)
1.	फ्लुक्सापायरोक्साड	333
2.	प्रोपान-1,2,3 ट्रायोल	101
3.	सी.आई. पिग्मेन्ट रेड 48:2(2-नेफ्थालीनकार्बोक्सीलीक एसिड, 4-[(5-क्लोरो-4-मेथाइल-2-सल्फोफेनाइल)एझो] -3-हायड्रॉक्सी-,कैल्शियम साल्ट (1:1)	50
4.	पानी में एक्रिलिक ग्राफ्ट कोपॉलिमर और प्रॉपीलीन ग्लायकॉल	41
5.	अमोनियम सॉल्ट पॉलीएरिलफिनाइल ईथर सल्फेट	25
6.	पॉलीडाईमिथाइलसिलॉक्सेन + फिलर, पानी में इमल्शन	5.4
7.	1,2-बेंजिसोथियाजोलिन-3-वन प्लस 2-मिथाइल-4-आइसोथियाजोलिन-3-वन अक्वस सॉल्यूशन में	3.7
8.	एक्सेन्थन गम	2.2
9.	सोडियम हायड्रोक्साइड	0.3
10.	पूर्णतः पानी	पर्याप्त परिणाम
	कुल	**1000.00**

घनत्व: 1.16 ग्राम/मिली।

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : नीचे दिये गये निर्देशानुसार बीजोपचार इस्तेमाल करने पर में फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली. एफएस जौवार में एन्थ्राकनोज़ रोग,सोयाबीन में रायजोक्टोनिया जड सडन और बीज पत्र के धब्बे तथा कपास में बीज रोग (रायजोक्टोनिया) के रोकथाम हेतु एक बहुत ही असरदार फफूँदनाशक है।

इस्तेमाल :

फसल	रोग का सामान्य नाम	निर्धारित मात्रा/किलो बीज			प्रतीक्षा अवधि (दिन)
		स.त. (ग्रा.)	मिश्रण (मिली)	घोल बनाने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा (मिली)	
जौवार	एन्थ्राकनोज़ रोग	0.33	1.0	बीजों को समान रूप से ढकने के लिए आवश्यक	लागू नहीं (बीज उपचार)
सोयाबीन	रायजोक्टोनिया जड सडन और बीज पत्र के धब्बे	0.33	1.0	बीजों को समान रूप से ढकने के लिए आवश्यक	लागू नहीं (बीज उपचार)
कपास	बीज रोग (रायजोक्टोनिया)	0.49	1.5	बीजों को समान रूप से ढकने के लिए आवश्यक	लागू नहीं (बीज उपचार)

लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।

जलिय जीवों के लिए हानिकारक होने के कारण जलाशयों अथवा मछली उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्रयोग ना करें।

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली. एफएस फफूँदनाशक है। इसका फसल बुआई से पहले बीजोपचार के लिए इस्तेमाल करें।

मौसम दशाएं : मौसम का इस्तेमाल पर प्रभाव नहीं पडता हैं।

मृदा : बीजोपचार बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखें।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : बीजों की छोटी राशि के लिये फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली. एफएस की आवश्यक मात्रा और पानी की आवश्यक मात्रा एक समान रूप से बीजों पर परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त का घोल बनाए इस घोल को बीजों में मिलाएं और कंटैनर (ड्रम/प्लास्टिक बॅग) को हिलाए (आमतौर पर एक मिनिट से कम समय तक) जिससे सारे बीज इस मिश्रण से एकसमान रुप में ढक जाये। बीज ड्रेसिंग का काम निरंतर करने वाले व्यवसायिक उपकरणों में फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली. एफएस को स्लरी के रुप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

मात्रा : जौवार और सोयाबीन में 1 मिली लीटर सूत्रण प्रति किलोग्राम बीज के लिए और कपास में 1.5 मिली लीटर सूत्रण प्रति किलोग्राम बीज के लिए।

मिश्रण के लिए अनुदेश : बीजों की छोटी राशि के लिये फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली. एफएस की आवश्यक मात्रा और पानी की आवश्यक मात्रा एक समान रूप से बीजों पर परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त का घोल बनाए इस घोल को बीजों में मिलाएं और कंटैनर (ड्रम/प्लास्टिक बॅग) को हिलाए (आमतौर पर एक मिनिट से कम समय तक) जिससे सारे बीज इस मिश्रण से एकसमान रुप में ढक जाये।

पुन: प्रवेश की अवधि : लागू नहीं।

फसल की कटाई पूर्व का अंतराल: लागू नहीं।

उपयोग का समय निर्धारण : यह बुआई से पहले बीजोपचार के लिये प्रयोग किया जाता है।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या: बीजोपचार केवल एकबार बुआई से पहले प्रयोग करे।

प्रस्थिति जिसके दौरान फफूँदनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगें : यह एक बीज उपचार उत्पाद है और पत्ते पर इस्तेमाल नहीं करें।

भंडारण : 1. फफूँदीनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और फफूँदीनाशक के स्वरूप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए। 2. फफूँदीनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

सुरक्षा सावधानियां : 1. घोल बनाते समय उसके छलके या छिटकने से त्वचा पर लगने या सांस द्वारा अंदर जाने से रोकें, खाली हाथ से घोल न बनाएं। 2. इस्तेमालकर्ता को पूर्णत: सुरक्षाकारी वस्त्र पहनने चाहिए, जिसमें रबर के दस्ताने, बूट, चेहरे का नकाब और रबर का पूरा एप्रन तथा हैट शामिल है।

विषबाधा के लक्षण : शुरूआती लक्षणों के रूप में सांस लेने में तकलीफ और सिमटने के मिले जुले प्रभाव देखे जा सकते हैं।

प्राथमिक उपचार : प्रदूषित कपड़ों को उतार दें। अगर दवा निगल ली गई हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं और डॉक्टरी उपचार दें। त्वचा पर लग जाने पर उस हिस्से को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। दवा आंखों में चली गयी हो तो पलकों को खुला रखते हुए आंखों को बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक धोएं। पेट में चले जाने पर तुरन्त मुंह धुलाएं, फिर 200-300 मिली. पानी पिलाएं तथा डॉक्टर को दिखाएं।

चिकित्सक को सलाह : विषबाधा होने पर मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें।

विष निवारण : कोई विशेष औषधोपचार नहीं है।

चेतावनी: खाली डिब्बों का पुन: उपयोग के लिए खतरनाक कंटेनरों /उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान: 1. डिब्बों, बची हुई सामग्रियों और मशीनों तथा डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार करना चाहिए कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

निर्माता: बीएएसएफ एग्री-प्रॉडक्शन एस.ए.एस., जोन इंडस्ट्रिएली ल्योन नोर्ड, रुई जैकर्ड-69727, जीने सेडेक्स, फ्रांस।

आयातकर्ता, पुन:पैकिंगकर्ता तथा विक्रेता: बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड. पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 37, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई), मुंबई - 400072, इंडिया. **फैक्टरी:** यूनिट नं. 4, गाँव निंबुआ, पो. मुबारकपूर, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब-140 201.

Hindi

ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસ
સિસ્ટિવા™
(બીજ ઉપચાર માટે ફૂગનાશક)
ઉપયોગ પૂર્વે પત્રક વાંચો

સિસ્ટિવામાં એક લિટર દીઠ ૩૩૩ જી/એલ ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ સમાવિષ્ટ છે. તે બીજ ઉપચાર માટે અત્યંત અસરકારક છે. તે જુવારમાં એન્થ્રેકનોઝ રોગ, સોયાબીનમાં રિઝોક્ટોનિયા મૂળ સડો અને કોટીલીડોનેરી ડાઘ, કપાસમાં બીજાંકુર રોગ (રિઝોક્ટોનિયા)ને કાબૂમાં લેવા માટેનું ફૂગનાશક છે.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ

અનુક્રમ	સામગ્રી	માત્રા ડબ્લ્યુ/વી (જી/એલ)
૧.	ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ એ. આઈ.	૩૩૩
૨.	પ્રોપેન-૧, ૨, ૩ ટ્રાયોલ	૧૦૧
૩.	સી.આઈ. પિગ્મેન્ટ રેડ ૪૮:૨ (૨-નેપ્થાલીન કાર્બોક્સીલિક એસિડ, ૪-[(૫-ક્લોરો-૪-મિથાઈલ-૨ સલ્ફોફિનાઈલ) એઝો] ૩-હાઈડ્રોક્સી-, કેલ્શિયમ સોલ્ટ (૧:૧)	૫૦
૪.	પાણીમાં એક્રિલિક ગ્રાફ્ટ કોપોલીમર અને પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ	૪૧
૫.	એમોનિયમ સોલ્ટ પોલીએરિલફિનાઈલ ઈથર સલ્ફેટ	૨૫
૬.	પાણીમાં પોલીડિમિથાઈલ સિલોક્સેન + ફિલર, ઈમલ્શન	૫.૪
૭.	એક્વિયસ સોલ્યુશનમાં ૧, ૨-બેન્ઝીસોથિયાઝોલિન- ૩-વન પ્લસ ૨-મિથાઈલ-૪-આઈઝોથિયાઝોલિન-૩-વન	૩.૭
૮.	ઝેન્થેન ગમ	૨.૨
૯.	સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ	0.3
૧૦.	સંપૂર્ણ ડિ-આયોનાઈઝડ પાણી	પૂરતી માત્રા
	કુલ	**૧૦૦૦.૦૦**

ઘનતાઃ મિલિ દીઠ ૧.૧૬ ગ્રા

છંટકાવ અને ઉપયોગ માટે ભલામણઃ બીજ ઉપચાર તરીકે નીચે આપેલી ભલામણો અનુસાર ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસ સોરગમમાં એન્થ્રેકનોઝ રોગ, સોયાબીનમાં રિઝોક્ટોનિયા મૂળ સડો અને કોટીલીડોનેરી ડાઘ અને કપાસમાં બીજાંકુર રોગ (રિઝોક્ટોનિયા)ને ઉત્તમ અંકુશ આપે છે.

પાક	રોગનાં સામાન્ય નામ	કિલો દીઠ બીજમાં માત્રા			થોભવાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એ.આઈ. (ગ્રામ)	રચના (મિલિ)	સ્લરી (મિલિ) બનાવવા માટે આવશ્યક પાણીની માત્રા	
જુવાર	એન્થ્રેકનોઝ	0.33	૧.0	બીજને એકસમાન આવરી લેવા માટે પૂરતું	લાગુ નહીં (સીડ ડ્રેસર)
સોયાબીન	રિઝોક્ટોનિયા મૂળ સડો, કોટીલેડોનરી ડાઘ	0.33	૧.0	બીજને એકસમાન આવરી લેવા માટે પૂરતું	લાગુ નહીં (સીડ ડ્રેસર)
કપાસ	બીજાંકુર રોગ	0.૪૯	૧.૫	બીજને એકસમાન આવરી લેવા માટે પૂરતું	લાગુ નહીં (સીડ ડ્રેસર)

આ લેબલ/પત્રકમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના પાક પર અજમાવશો નહીં.

ઉત્પાદન સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે. આથી પાણીના હોજ નજીક ઉપયોગ ટાળો.

છંટકાવનો સમય અને પાકના તબક્કાઃ ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસ પાકની વાવણી પૂર્વે બીજ ઉપચાર તરીકે ઉપયોગ કરવાનું ફૂગનાશક છે.

હવામાનની સ્થિતિઓઃ હવામાનની સ્થિતિનો છંટકાવ પર કોઈ પ્રભાવ નહીં પડે.

માટીઃ ઉપચારિત બીજના અંકુરણ માટે માટીમાં ઉત્તમ નમી જાળવી રાખો.

છંટકાવની ટેકનિક, ઉપકરણના પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકારઃ નાના જથ્થા માટે ઉત્પાદન ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસની આવશ્યક માત્રા પૂરતા પાણી સાથે મિશ્રણ કરીને બીજ પર એકસમાન છંટકાવ કરો. બીજ પર સ્લરી ઉમેરો અને બીજ પર એકસમાન લાગે નહીં (સામાન્ય રીતે એક મિનિટથી ઓછો સમય) ત્યાં સુધી કન્ટેઈનર (ડ્રમ/પ્લાસ્ટિક બેગ) ફેરવો અથવા હલાવો. ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસ એકધાર્યા સંચાલિત વ્યાવસાયિક સીડ ડ્રેસિંગ ઉપકરણો સાથે છંટકાવ માટે સ્લરી તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

માત્રાઃ સોરગમ અને સોયાબીનમાં એક કિલો બીજ દીઠ ૧.0 મિલિ રચના, એક કિલો કપાસ દીઠ ૧.૫ મિલિ રચના.

મિશ્રણ માટે સૂચનાઃ નાના જથ્થા માટે ઉત્પાદન ફ્લક્સાપાયરોક્સેડ ૩૩૩ જી/એલ એફએસની આવશ્યક માત્રા પૂરતા પાણી સાથે મિશ્રણ કરીને બીજ પર એકસમાન છંટકાવ કરો. બીજ પર સ્લરી ઉમેરો અને બીજ પર એકસમાન લાગે નહીં (સામાન્ય રીતે એક મિનિટથી ઓછો સમય) ત્યાં સુધી કન્ટેઈનર (ડ્રમ/પ્લાસ્ટિક બેગ) ફેરવો અથવા હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળોઃ લાગુ નહીં.

પીએચઆઈઃ લાગુ નહીં

છંટકાવનો સમયઃ વાવણી પૂર્વે બીજ ઉપચાર તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતાઃ વાવણી પૂર્વે ફક્ત એક વાર બીજ ઉપચાર.

ફૂગનાશક કોઈ પણ પાક પર છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ તે તબક્કાઃ આ બીજ ઉપચાર ઉત્પાદન છે અને પાન પર છંટકાવ તરીકે ઉપયોગ નહીં કરવા જોઈએ.

સંગ્રહ : ૧. ફૂગનાશકોનો સમાવેશ ધરાવતું પેકેજ ખાસ કરીને ખાદ્ય સામગ્રીઓ જેવી અન્ય સામગ્રી સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રૂમ કે સંકુલથી દૂર અલગ રૂમ કે સંકુલમાં સંગ્રહ કરવો અથવા અલગ રૂમમાં કે તાળાં-ચાવી મારી શકાય એવા કબાટમાં રાખવું. ૨. ફૂગનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ કે સંકુલમાં સારો ઉજાશ હોવો જોઈએ, જગ્યા સૂકી અને હવાઉજાશવાળી હોય જોઈએ અને બાષ્પથી પ્રદૂષણ ટાળવા માટે જગ્યા પૂરતી હોવી જોઈએ.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓઃ ૧. શ્વાસમાં નહીં જવું જોઈએ અને ઢોળાવાથી કે ઊડવાથી ત્વચા સાથે સંપર્ક નહીં થવો જોઈએ. ખુલ્લા હાથથી મિશ્રણ નહીં કરો. ૨. ઉપભોક્તાએ સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવાં જોએ, જેમાં રબરનાં હાથમોજાં, જૂતાં, ફેસ શિલ્ડ અને એકંદર અથવા રબરનો એપ્રોન અથવા હેટનો સમાવેશ થાય છે.

ઝેરનાં લક્ષણોઃ વહેલાં લક્ષણોમાં ડાયસ્પનોઈયા અને કાવરિંગનું કોઈ પણ સંયોજન ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને શાંત રાખો, તેને તાજી હવામાં બહાર લાવો અને તબીબને બતાવો, ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. આંખો સાથે સંપર્ક થવા પર કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી પાંપણ ખુલ્લી રાખીને આંખો પર વહેતું પાણી રેડો. પેટમાં જવા પર તાત્કાલિક મોઢું પાણીમાં બોળો અને ૨૦૦- ૩૦૦ મિલિ પાણી પીઓ. તબીબને બતાવો.

તબીબને સલાહઃ ઝેર લાગુ થતાં લક્ષણાત્મક ઉપાય કરો.

પ્રતિકારક : કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી.

ચેતવણી : ખાલી ડબ્બાઓ ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.

ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાનો સુરક્ષિત નિકાલ : ૧. પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને મશીન તથા ડબ્બાઓના ધોવાણનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાં, જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ ટળે. ૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ થવાનું ટાળવા માટે તે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડી દેતા. ૩. પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં.

ઉત્પાદકઃ બીએએસએફ એગ્રી-પ્રોડકશન એસ.એ.એસ., ઝોન ઈન્ડસ્ટ્રિયલી લિયોન નોર્ડ, ર્યુ જેકર્ડ - ૬૯૭૨૭, જીને સેડેક્સ, ફ્રાન્સ.

આયાત, રિપેક કરનાર અને વિકેતાઃ બીએએસએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, નોંધણીકૃત કચેરી : પ્લોટ નં. ૩૭, ચાંદિવલી ફાર્મ રોડ, ચાંદિવલી, અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૭૨, ઈન્ડિયા.

ફેક્ટરી : યુનિટ નં. ૪, ગામ નિંબુઆ, પી.ઓ. મુબારકપુર, તહેસીલ ડેરા બસ્સી, જિ. મોહાલી, પંજાબ-૧૪૦૨૦૧.

Gujarati

फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस
सिस्टिवा™
(बियाणांवरील उपचारांसाठी फंगिसाईड)
उपयोग करण्यापुर्वी माहितीपुस्तिका वाचा.

सिस्टिवा मध्ये 333 जी/एल फ्लक्सापायरोक्साड आहे. ज्वारीवरील (सोरघम) अ‍ॅन्थ्राकनोस, सोयाबिनमधील रायझोक्टोनिया रूट रॉट आणि कोटिलेडोनरी स्पॉट आणि कापसाच्या बियाणांवरील रोग (रायझोक्टोनिया) वगैरे रोगावरील नियंत्रणासाठी हे बियाणांवरील उपचारांसाठी अतिशय प्रभावी फंगिसाईड आहे.

रासायनिक मिश्रण:

अनु.क्र.	घटक	सामग्री डब्ल्यू/व्ही (जी/एल)
1.	फ्लक्सापायरोक्साड ए. आय.	333
2.	प्रोपन -1,2,3 ट्रायोल	101
3.	सी.आय. पिगमेन्ट रेड 48:2 (2-नाप्थलिन कार्बोक्सिलिक ॲसिड, 4-[(5-क्लोरो-4-मेथिल-2-सल्फोफिनाईल)ॲझो] -3-हायड्रोक्सी, कॅल्शियम सॉल्ट (1:1)	50
4.	ॲक्रिलिक ग्राफ्ट कोपोलिमर पाण्यात आणि प्रॉपिलिन ग्लायकोलमध्ये	41
5.	अमोनियम सॉल्ट पॉलिअरिलफिनाईल इथर सल्फेट	25
6.	पॉलिडिमिथाईल सायलोक्सेन + फिलर, पाण्यातील इमल्शन	5.4
7.	1,2-बेन्झिसोथायझोलिन-3-वन प्लस 2-मिथाईल-4-आयसोथायझोलिन-3-वन पाण्यातील द्रावण	3.7
8.	झान्थन गम	2.2
9.	सोडियम हायड्रोक्साईड	0.3
10.	संपूर्ण डिआयोनाईज केलेले पाणी	क्यू.एस.
	एकूण	1000.00

घनता: 1.16 ग्रॅम/मि.ली.

उपयोग आणि उपयोगासाठी शिफारस: खालील सूचनांनुसार बियाणांवरील उपचारांसाठी उपयोग केला असता, फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस ज्वारीवरील (सोरघम) अ‍ॅन्थ्राकनोस, सोयाबिनमधील रायझोक्टोनिया रूट रॉट आणि कोटिलेडोनरी स्पॉट आणि कापसाच्या बियाणांवरील रोग (रायझोक्टोनिया) यावर चांगले नियंत्रण मिळवून देते.

पीक	रोगाचे सामायिक नाव	डोस/किलो बियाणे			प्रतिक्षा कालावधी (दिवस)
		ए. आय. (ग्रॅम्स)	मिश्रण (मि.ली.)	स्लरी बनविण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे प्रमाण (मि.ली.)	
ज्वारी	अ‍ॅन्थ्राकनोस	0.33	1.0	बियाणांवर समान प्रमाणात आच्छादन करण्यासाठी पुरेसे	लागू नाही (सिड ड्रेसर)
सोयाबिन	रायझोक्टोनिया रूट रॉट, कोटिलेडोनरी स्पॉट	0.33	1.0	बियाणांवर समान प्रमाणात आच्छादन करण्यासाठी पुरेसे	लागू नाही (सिड ड्रेसर)
कापूस	बियाणांवरील रोग	0.49	1.5	बियाणांवर समान प्रमाणात आच्छादन करण्यासाठी पुरेसे	लागू नाही (सिड ड्रेसर)

ह्या माहितीपुस्तिकेत/पत्रकात नमूद केल्याव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.

जलचर व जिवाणूंसाठी हे उत्पादन विषारी आहे. पाण्याच्या साठ्यांच्या जवळ उपयोग करणे टाळा.

उपयोग करण्याची वेळ आणि पिकाचा टप्पा: फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस हे फंगिसाईड असून पिकाची पेरणी करण्यापुर्वी बियाणांवरील उपचारांसाठी त्याचा उपयोग केला जातो.

हवामानाची परिस्थिती: हवामानाच्या परिस्थितीचा उपयोग करण्यावर कोणताही परिणाम होत नाही.

जमिन: उपचार केलेल्या बियाणांना अंकूर फुटण्यासाठी जमिन चांगली ओलसर ठेवा.

उपयोग करण्याचे तंत्र, उपकरणाचा प्रकार, नोझलचा प्रकार: लहान प्रमाणासाठी, फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस हे उत्पादन बियाणे समान प्रकारे आच्छादण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात पाण्यात मिसळा. बियाणांमध्ये स्लरी मिसळा आणि बियाणांवर समान प्रकारे आच्छादन येईपर्यंत (साधारणपणे एक मिनिटापेक्षा कमी काळ) कंटेनर (ड्रम/प्लॅस्टिकची पिशवी) गोल फिरवा किंवा घुसळा. व्यावसायिक बियाणांचे आच्छादन करणाऱ्या उपकरण सतत चालवून त्यात देखील फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस चा स्लरीच्या स्वरूपात उपयोग करता येतो. डोस: ज्वारी आणि सोयाबिनसाठी प्रति किलो बियाणांसाठी 1.0 मि.ली. मिश्रण; कापसाच्या प्रति किलो बियाणांसाठी 1.5 मि.ली.

मिश्रण तयार करण्यासाठी सूचना: लहान प्रमाणासाठी, बियाणे समान प्रकारे आच्छादण्यासाठी आवश्यक प्रमाणातील उत्पादन फ्लक्सापायरोक्साड 333 जी/एल एफएस आवश्यक प्रमाणात पाण्यात मिसळा. ही स्लरी बियाणांमध्ये टाका आणि बियाणांवर समान प्रकारे आच्छादन येईपर्यंत (साधारणपणे एक मिनिटापेक्षा कमी काळ) कंटेनर (ड्रम/प्लॅस्टिकची पिशवी) गोल फिरवा किंवा घुसळा.

पुन:प्रयोग कालावधी: लागू नाही.

पीएचआय: लागू नाही

उपयोग करण्याची वेळ: पेरणीपुर्वी बियाणांवरील उपचारांसाठी याचा उपयोग केला जातो.

फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता: बियाणांवरील उपचार फक्त पेरणीपुर्वी एकदाच.

कोणत्याही पिकावर फंगिसाईडचा उपयोग न करण्याचे टप्पे: हे बियाणांवर उपचार करण्याचे उत्पादन आहे आणि पानांवरील फवारणीसाठी त्याचा उपयोग करू नये.

साठवणी: 1. बुरशीनाशक असलेले पॅकेजेस, त्याचप्रमाणे आणि बुरशीनाशकचे स्वरूप यानुसार, खास करून खाद्यपदार्थ सारख्या वस्तू साठवून ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा वास्तूत साठवून ठेवावीत किंवा स्वतंत्र कपाटात कुलुपबंद स्थितीत ठेवावीत. 2. बुरशीनाशक साठविण्याच्या खोल्या किंवा वास्तू चांगल्या बांधलेल्या, हवेशीर, चांगला उजेड असलेल्या आणि हवा खेळती असलेल्या आणि बाष्पाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

सुरक्षिततेसंबंधी खबरदारी: 1. मिश्रण तयार करताना सांडण्यामुळे किंवा सपकारा उडण्यामुळे श्वासावाटे आत जाणे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. उघड्या हातांनी मिश्रण तयार करू नका. 2. उपयोग करणाऱ्या व्यक्तीने संपूर्ण संरक्षक कपडे वापरावेत ज्यात रबर ग्लोवज, बूटस, फेस शिल्ड आणि ओव्हरऑल किंवा रबराचा ॲप्रन किंवा हॅटचा उपयोग करावा.

विषबाधेची लक्षणे: प्राथमिक लक्षणे ही श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि अंग आकसणे ह्यापैकी काहीही एकत्रितपणे होऊ शकते.

प्रथमोपचार: दुषित कपडे काढून टाका. श्वासावाटे आत गेल्यास, रूग्णाला शांत ठेवा, ताज्या हवेत न्या, आणि वैद्यकीय मदत मागवा. त्वचेशी संपर्क आल्यास, साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा. डोळ्याशी संपर्क आल्यास, किमान 15 मिनिटे धावत्या पाण्याखाली आणि डोळे उघडे ठेवून हानी पोहोचलेले डोळे स्वच्छ धुवा. पोटात गेल्यास, ताबडतोब तोंड खळबळून धुवा आणि त्यानंतर 200-300 मि.ली. पाणी प्या, वैद्यकीय मदत मागवा.

फिजिशिअनसाठी सल्ला: विषबाधा झाल्यास लक्षणांनुसार उपचार द्या.

उतारा: कोणताही खास ज्ञात उतारा नाही.

धोक्याची सूचना: रिकाम्या कंटेनरचा पुनरूपयोग करणे धोकादायक आहे.

वापरलेले कंटेनर सुरक्षितपणे नष्ट करणे: 1. पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी पॅकेजेस किंवा उरलेला माल आणि यंत्रातील आणि कंटेनर्स मधील धुतलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे. 2. उपयोग केलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नये. 3. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

निर्माते: बीएएसएफ ॲग्री-प्रॉडक्शन एस.ए.एस., झोन इंडिस्ट्रिअल लिऑन नॉर्ड, रूए जॅकॉर्ड - 69727, जिने सेडेक्स, फ्रान्स.

आयात, पुन:पॅकिंग आणि विपणन : बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. 37, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई), मुंबई - 400072, इंडिया.

कारखाना: युनिट क्र. 4, व्हिलेज निबुआ, पी.ओ.मुबारकपूर, तहसिल डेरा बस्सी, जिल्हा मोहाली, पंजाब-140201.

Marathi

ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ
ਸਿਸਟਿਵਾ™
(ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਲੀਮਾਰ)
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸਤਿਕਾ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿਸਟਿਵਾ ਵਿੱਚ ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ਦਾ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ ਜੜ ਸਾੜ ਅਤੇ ਕੋਟਾਈਲੇਡੋਨਰੀ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਰਿਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਉੱਲੀਮਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਲ. ਸੰ.	ਸਮੱਗਰੀ	ਤੱਤ ਡਬਲਿਊ/ਵੀ (ਜੀ/ਐਲ)
੧.	ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ਏ.ਆਈ.	੩੩੩
੨.	ਪ੍ਰੋਪਾਨ-੧,੨,੩ ਟ੍ਰਿਓਲ	੧੦੧
੩.	ਸੀ.ਆਈ. ਪਿਗਮੇਂਟ ਰੈਡ ੪੮:੨ (੨-ਨਾਫਥਾਲੇਨੇਕਾਰਬੋਕਸੀਲਿਕ ਐਸਿਡ, ੪-[(੫-ਕਲੋਰੋ-੪-ਮੇਥਾਇਲ-੨-ਸਲਫੋਫੇਨਾਇਲ)ਅਜ਼ੋ] -੩-ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸੀ-,ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਸਾਲਟ (੧:੧)	੫੦
੪.	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੋਪੋਲਿਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਿਲੇਨ ਗਲਾਇਕੋਲ	੪੧
੫.	ਅਮੋਨਿਅਮ ਸਾਲਟ ਪੋਲੀਅਰਾਇਲਫੇਨਾਇਲ ਈਦਰ ਸਲਫੇਟ	੨੫
੬.	ਪੋਲੀਡਿਮੇਥਾਇਲਸਿਲੋਕਸੇਨ + ਫਿਲਰ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਮਲਸ਼ਨ	੫.੪
੭.	ਜਲਮਈ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ੧,੨-ਬੇਂਜਿਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲਿਨ-੩-ਇੱਕ ਪਲਸ ੨-ਮੇਥਾਇਲ-੪-ਆਇਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲਿਨ-੩-ਇੱਕ	੩.੭
੮.	ਜ਼ੈਂਥਮ ਗਮ	੨.੨
੯.	ਸੋਡਿਅਮ ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸਾਇਡ	੦.੩
੧੦.	ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਆਯੋਨਾਇਜ਼ਡ ਪਾਣੀ	ਕਯਾਊ.ਐਸ.
	ਕੁਲ	੧੦੦੦.੦੦

ਘਣਤਾ: ੧.੧੬ ਗ੍ਰਾ./ਮਿਲੀ.

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ ਜਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੋਯਾਬੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ ਜੜ ਸਾੜ ਅਤੇ ਕੋਟਾਈਲੇਡੋਨਰੀ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਰਿਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ) ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲ	ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ ਕਿਗ੍ਰਾ ਬੀਜ			ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਮਿਲੀ)	ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ(ਮਿਲੀ)	
ਜਵਾਰ	ਐਂਥ੍ਰੈਕਨੋਸ	੦.੩੩	੧.੦	ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ (ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਰ)
ਸੋਯਾਬੀਨ	ਰਿਜ਼ੋਕਟੋਨੀਆ ਜੜ ਸਾੜ, ਕੋਟਾਈਲੇਡੋਨਰੀ ਧੱਬੇ	੦.੩੩	੧.੦	ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ (ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਰ)
ਕਪਾਹ	ਬੂਟਾ ਬਿਮਾਰੀ	੦.੪੯	੧.੫	ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ (ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਰ)

ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦ ਜਲਮਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਚਰਣ: ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਉੱਲੀਮਾਰ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੁਰਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਲਈ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾਓ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਡੱਬੇ (ਡ੍ਰਮ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ) ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ)। ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ਼ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਘੋਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ: ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਯਾਬੀਨ ਵਿੱਚ ੧.੦ ਮਿਲੀ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਬੀਜ; ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ੧,੫ ਮਿਲੀ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਬੀਜ।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਲਈ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਫਲੁਕਸਾਪਾਈਰੋਕਸਾਡ ੩੩੩ ਜੀ/ਐਲ ਐਫਐਸ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾਓ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਡੱਬੇ (ਡ੍ਰਮ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ) ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ)।

ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਅਵਧੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

ਪੀਐਚਆਈ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਆਵਿਰਤੀ: ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜ ਇਲਾਜ।

ਉਹ ਚਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਲੀਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਿਅਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ : ੧. ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡੁੱਲਣ ਜਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ੨. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਅਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਹੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲਛਣ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਸਾਹ ਚੜਣ ਅਤੇ ਕੋਵਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ੨੦੦-੩੦੦ ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਚਿਕਿਤਸਕ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਾਰਨਿੰਗ : ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧. ਖ਼ਾਲੀ ਪੈਕਿਟ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ੨. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਦਿਓ।

ਨਿਰਮਾਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਐਗ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ੋਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਲ ਲਿਓਨ ਨਾੱਰਡ, ਰੂਏ ਜੈਕਵਾਰਡ ੬੯੭੨੭, ਗਿਨੇ ਸੀਡੇਕਸ, ਫ੍ਰਾਂਸ।

ਆਯਾਤਕ, ਪੁਨਰ-ਪੈਕ ਅਤੇ ਵਿਤੱਰਣ : ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ : ਪਲਾੱਟ ਨੰ. ੩੭, ਚਾਂਦੀਵਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਰੋਡ, ਚਾਂਦੀਵਲੀ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂ.), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੦੭੨, ਭਾਰਤ.

ਫ਼ੈਕਟਰੀ : ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪, ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ.ਓ. ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ-੧੪੦੨੦੧.

Punjabi

BASF
We create chemistry

FLUXAPYROXAD 333 G/L FS
Systiva®
(Fungicide for seed treatment)

फ्लुक्सापायरोक्साड 333 ग्रा/ली एफएस
सिस्टिवा™
(बीजोपचार के लिए फफूँदनाशक)

Read Instructions carefully before use
प्रयोग के पहले सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ लिजिए

Manufactured by:
BASF Agri-Production S.A.S.,
Zone Industrielle Lyon Nord,
Rue Jacquard, 69727 Genay Cedex,
France.
Imported, Re-packed and Marketed by :
BASF India Limited,
Registered office: Plot No. 37,
Chandivali Farm Road, Chandivali,
Andheri (East), Mumbai - 400072, India.
Factory: Unit No. 4, Village Nimbua,
P. O. Mubarakpur, Tehsil Dera Bassi,
Distt. Mohali, Punjab - 140201.

Consumer Care Cell:
Manager Consumer Cell,
BASF India Limited,
address as above,
Tel.: (0)7415002222,
E-mail :
consumeragro-india@basf.com

निर्माता:
बीएएसएफ एग्री-प्रॉडक्शन एस.ए.एस.,
जोन इंडस्ट्रिएली ल्योन नोर्ड,
रुई जैकर्ड-69727, जीने सेडेक्स, फ्रांस।
आयातकर्ता, पुन:पैकिंगकर्ता तथा विक्रेता:
बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 37, चांदिवली
फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (ई),
मुंबई - 400072, इंडिया.
फैक्टरी: यूनिट नं. 4, गाँव निंबुआ,
पो. मुबारकपूर, तहसिल देरा बस्सी,
जिला. मोहाली, पंजाब-140 201.

® = Registered Trademark of BASF Group Company
® = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का रजिस्ट्रड ट्रेडमार्क
TM = Trademark of BASF Group Company
TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

F2161
Purab

Actual Size : 310mm (W) x 215mm (H)

ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড ৩৩৩ জি/এল এফএস

সিষ্টিভা™

(বীজশোধনের জন্যে ছত্রাকনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ুন

সিষ্টিভা'য় আছে ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাডের ৩৩৩ জি/এল। এটা জোয়ারে অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ, সয়াবিনে রিজোক্টোনিয়া শেকড় পচা এবং কোটাইলডোনারী দাগ তথা তুলোয় চারার রোগ (রিজোক্টোনিয়া) নিয়ন্ত্রণ করতে বীজশোধন ছত্রাকনাশক হিসাবে অত্যন্ত প্রভাবদায়ক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

ক্রঃ নং	উপাদান	পরিমাণ ওজন/ঘনমান (গ্রাঃ/লিঃ)
১.	ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড সঃ উঃ	৩৩৩
২.	প্রোপ্যান-১,২,৩ ট্রিয়ল	১০১
৩.	সি.আই. পিগমেন্ট রেড ৪৮:২ (২-ন্যাফথালিনকার্বক্সাইলিক অ্যাসিড, ৪-[(৫-ক্লোরো-৪-মিথাইল-২-সালফোফিনাইল) অ্যাজো]-৩-হাইড্রক্সি-, ক্যালসিয়াম লবণ (১:১)	৫০
৪.	জলেতে অ্যাক্রেলিক গ্র্যাফ্ট কোপলিমার এবং প্রোপাইলিন গ্লাইকল	৪১
৫.	অ্যামোনিয়াম লবণ পলিঅ্যারাইলফিনাইল ইথার সালফেট	২৫
৬.	পলিডাইমিথাইলসিলক্সেন + ফিলার, জলেতে ইমালশন	৫.৪
৭.	জলজ দ্রবণে ১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলিন-৩-ওয়ান প্লাস ২-মিথাইল-৪-আইসোথিয়াজোলিন-৩-ওয়ান	৩.৭
৮.	জ্যান্থান আঠা	২.২
৯.	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড	০.৩
১০.	সম্পূর্ণরূপে ডি-আয়োনাইজড জল	যথেষ্ট পরিমাণ
	মোট	১০০০.০০

ঘনত্ব : ১.১৬ গ্রাঃ/মিঃলিঃ

প্রয়োগ এবং ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ : বীজশোধন হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসারে ব্যবহৃতের ক্ষেত্রে, ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড ৩৩৩ জি/এল এফএস জোয়ারে অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ, সয়াবিনে রিজোক্টোনিয়া শেকড় পচা এবং কোটাইলডোনারী দাগ তথা তুলোয় চারার রোগের (রিজোক্টোনিয়া) ভালো নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা বীজের কেজি			অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাম)	ফর্মূলেশন (মিঃলিঃ)	পাতলা কাই বানাতে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ (মিঃলিঃ)	
জোয়ার	অ্যান্থ্রাকনোজ	০.৩৩	১.০	একসমানভাবে বীজে প্রলেপ দিতে যথেষ্ট	প্রযোজ্য নয় (সীড ড্রেসার)
সয়াবিন	রিজোক্টোনিয়া শেকড় পচা, কোটাইলডোনারী দাগ	০.৩৩	১.০	একসমানভাবে বীজে প্রলেপ দিতে যথেষ্ট	প্রযোজ্য নয় (সীড ড্রেসার)
তুলো	চারার রোগের	০.৪৯	১.৫	একসমানভাবে বীজে প্রলেপ দিতে যথেষ্ট	প্রযোজ্য নয় (সীড ড্রেসার)

এই লেবেল/লিফলেটে নির্দিষ্টকরা ছাড়া অন্য ফসলের ওপর ব্যবহৃত হবে না।

এই উৎপাদ জলজ জীবদের প্রতি বিষাক্ত। জলের জায়গার নিকটে ব্যবহার করা এড়াবেন।

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্য্যায় : ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড ৩৩৩ জি/এল এফএস হচ্ছে ফসল বপনের পূর্বে বীজশোধন হিসাবে ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক।

আবহাওয়ার অবস্থা : প্রয়োগের ওপর আবহাওয়ার অবস্থার কোনও প্রভাব নেই।

মাটি : শোধিত বীজের অঙ্কুরোদ্গমনের জন্যে মাটির ভালো আর্দ্রতা বজায় রাখুন।

প্রয়োগের কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজলের প্রকার : অল্প পরিমাণের জন্যে, একসমানভাবে বীজে প্রলেপ দিতে যথেষ্ট জলের সঙ্গে ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড ৩৩৩ জি/এল এফএস উৎপাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেশান। বীজেতে পাতলা কাই দিন এবং বীজগুলো একসমানভাবে প্রলেপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত (সাধারণতঃ এক মিনিটের থেকে কম) কন্টেনার (ড্রাম/প্লাস্টিক ব্যাগ) ঘোরান বা নাড়ান। নাগাড়ে প্রচালনা করা বাণিজ্যিক সীড ড্রেসিং সরঞ্জাম দিয়ে প্রয়োগের জন্যে পাতলা কাই হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

মাত্রা : জোয়ার এবং সয়াবিনে প্রতি কেজি বীজে ১.০ মিঃলিঃ ফর্মূলেশন; তুলোয় প্রতি কেজি বীজে ১.৫ মিঃলিঃ ফর্মূলেশন।

মেশানোর জন্যে নির্দেশ : অল্প পরিমাণের জন্যে, একসমানভাবে বীজে প্রলেপ দিতে যথেষ্ট জলের সঙ্গে ফ্লুক্সাপাইরক্স্যাড ৩৩৩ জি/এল এফএস উৎপাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেশান। বীজেতে পাতলা কাই দিন এবং বীজগুলো একসমানভাবে প্রলেপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত (সাধারণতঃ এক মিনিটের থেকে কম) কন্টেনার (ড্রাম/প্লাস্টিক ব্যাগ) ঘোরান বা নাড়ান। নাগাড়ে প্রচালনা করা বাণিজ্যিক সীড ড্রেসিং সরঞ্জাম দিয়ে প্রয়োগের জন্যে পাতলা কাই হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

পুনঃ প্রবেশের সময়কাল : প্রযোজ্য নয়।

পিএইচআই : প্রযোজ্য নয়।

প্রয়োগের সময় : এটা বপনের পূর্বে বীজশোধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্প্রে করার সর্বাধিক বার সমতে পুনঃপুনঃতা : বপনের পূর্বে মাত্র একবার বীজশোধন করা।

কোন পর্য্যায়গুলো চলাকালীন কোনও ফসলের ওপর ছত্রাকনাশক প্রয়োগিত হবে না : এটা বীজশোধনের উৎপাদ এবং পাতায় ছেটানো হিসাবে প্রয়োগিত হবে না

মজুতকরণ : ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজ অন্যান্য সামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্য পদার্থ মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা চৌহদ্দি থেকে দূরে পৃথক ঘর বা চৌহদ্দিতে মজুত করতে হতে হবে অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা চৌহদ্দি হতে হবে সুনির্মিত, হাওয়াবাতাসযুক্ত, সুআচ্ছাদিত ও বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা দূষণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত আয়তনযুক্ত।

সুরক্ষা সতর্কতা : ১. উপচে পড়া বা ছলকানোর কারণে তরলীকরণের সময় শ্বাসে যাওয়া এবং ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। খালি হাত দিয়ে মেশাবেন না। ২. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরতে হবে, যাতে শামিল থাকবে রাবারের হাতমোজা, বুটজুতো, মুখ ঢাকার ঢাল এবং ওভারঅল বা রাবারের অ্যাপ্রণ বা টুপি।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : প্রারম্ভিক লক্ষণাদি হিসাবে শাবাসকষ্ট এবং ভয়ে জড়সড় হওয়ার যেকোন সমন্বয় হয়ত হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : দূষিত পোশাক খুলে দেবেন। শ্বাসে গেলে, রোগীকে শান্ত রাখবেন, মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন এবং মেডিকেল শরণাপন্ন করবেন। ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শের ক্ষেত্রে, সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে ধোবেন। চোখের সঙ্গে সংস্পর্শের ক্ষেত্রে, চোখের পাতা খোলা রেখে জলধারার নীচে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে আক্রান্ত চোখ ধোবেন। গিলে ফেলার ক্ষেত্রে, অবিলম্বে মুখ ধুয়ে দেবেন এবং তারপর ২০০-৩০০ মিঃলিঃ জল পান করাবেন, মেডিকেল শরণাপন্ন করবেন।

চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ : বিষাক্ততার ক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী থেরাপী প্রয়োগ করবেন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই।

সতর্কীকরণ : খালি পাত্রাদি পুনর্ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

ব্যবহৃত পাত্রাদির নিরাপদ বিনষ্টিকরণ : ১. প্যাকগুলো বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

নির্মাতা: বিএএসএফ অ্যাগ্রী-প্রোডাকশন এস.এ.এস, জোন ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লিয়ন নর্ড, রুই জ্যাক্যুয়ার্ড ৬৯৭২৭, জিনে সিডেক্স, ফ্রান্স।

আমদানি, পুনঃ প্যাক এবং বিপণনকারী: বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পঞ্জীকৃত কার্য্যালয়: বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পঞ্জীকৃত কার্য্যালয় : প্লট নং ৩৭, চান্দিভলী ফার্ম রোড, চান্দিভলী, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৭২, ভারত।

কারখানা: ইউনিট নং ৪, গ্রাম-নিম্বুয়া, পোঃ অঃ- মুবারকপুর, মহকুমা- দেরা বাসাই, জেলা- মোহালি, পাঞ্জাব-১৪০২০১।

Bengali

ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍

ସିଷ୍ଟିଭା™

(ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଫିମ୍ପିନାଶକ)

ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଗରୁ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ

ସିଷ୍ଟିଭା ରେ ଅଛି ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ । ଜୋଆର ରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ବେମାରୀ, ସୋୟବୀନ୍ ରେ ରାଇଜୋକ୍ଟୋନିଆ ଚେର ପଚା ଓ କୋଟାଇଲଡୋନରୀ ଦାଗ ଆଉ କପା ରେ ଚଳି ବେମାରୀ (ରାଇଜୋକ୍ଟୋନିଆ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	ନିହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ (ଜି/ଏଲ)
୧.	ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ସ.ଉ.	୩୩୩
୨.	ପ୍ରୋପାନ୍-୧,୨,୩ ଟ୍ରିଓଲ୍	୧୦୧
୩.	ସି.ଆଇ. ପିଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ରେଡ୍ ୪୮:୨ (୨-ନାଫ୍‌ଥାଲିନ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ, ୪-[(୫-କ୍ଲୋରୋ-୪-ମିଥାଇଲ୍-୨-ସଲ୍‌ଫୋଫେନିଲ୍)ଆଜୋ] -୩-ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି-, କାଲ୍‌ସିଅମ୍ ସଲ୍ଟ(୧:୧)	୫୦
୪.	ପାଣି ଆଉ ପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟ କୋପଲିମର୍	୪୧
୫.	ଆମୋନିଅମ୍ ସଲ୍ଟ ପଲିଏରିଲ୍‌ଫେନିଲ୍ ଇଥର୍ ସଲ୍‌ଫେଟ୍	୨୫
୬.	ପଲିଡାଇମେଥିଲ୍‌ସିଲୋକ୍ସେନ୍ + ପାଣିରେ ଫିଲର୍, ଇମଲ୍‌ସନ୍	୫.୪
୭.	୧,୨-ବେଞ୍ଜିସୋଥିଆଜୋଲିନ୍ -୩-ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୨-ମିଥାଇଲ୍-୪-ଆଇସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ୱାନ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ	୩.୭
୮.	କ୍ସାନ୍ଥନ୍ ଗମ୍	୨.୨
୯.	ସୋଡିଅମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍	୦.୩
୧୦.	ପୁରା ଡି-ଆୟୋନାଇଜ୍‌ଡ ପାଣି	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ	୧୦୦୦.୦୦

ଘନତା : ୧.୧୬ ଗ୍ରା./ମି.ଲି.

ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ : ତଳ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ବିହନ ଉପଚାର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ, ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍ ଜୋଆର ର ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ବେମାରୀ, ସୋୟବୀନ୍'ର ରାଇଜୋକ୍ଟୋନିଆ ଚେର ପଚା ଓ କୋଟାଇଲଡୋନରୀ ଦାଗ ଆଉ କପା'ର ଚଳି ବେମାରୀ (ରାଇଜୋକ୍ଟୋନିଆ) କୁ ବଢ଼ିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

ଫସଲ	ବେମାରୀର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	କେଜି ବିହନ ପାଇଁ ମାତ୍ରା			ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ପରିମାଣ (ମି.ଲି.)	
ଜୋଆର	ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍	୦.୩୩	୧.୦	ବିହନକୁ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ	ଅନାବଶ୍ୟକ (ବିହନ ଡ୍ରେସର୍)
ସୋୟବୀନ୍	ରାଇଜୋକ୍ଟୋନିଆ ଚେର ପଚା, କୋଟାଇଲଡୋନରୀ ଦାଗ	୦.୩୩	୧.୦	ବିହନକୁ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ	ଅନାବଶ୍ୟକ (ବିହନ ଡ୍ରେସର୍)
କପା	ବିହନ ବେମାରୀ	୦.୪୯	୧.୫	ବିହନକୁ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ	ଅନାବଶ୍ୟକ (ବିହନ ଡ୍ରେସର୍)

ଏହି ଲେବଲ୍/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ ।

ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଜଳଜାତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ । ତେଣୁ ପାଣି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ପ୍ରୟୋଗ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଫିମ୍ପିନାଶକ, ଯାହାକୁ ଫସଲ ପାଇଁ ରୋଇବା ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧକ ରୂପେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ।

ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି : ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ।

ମୃତ୍ତିକା : ଉପଚାରିତ ବିହନର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍‌ଗମ ପାଇଁ ଭଲ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ ।

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି, ଉପକରଣ ପ୍ରକାର, ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : କମ ମାତ୍ରା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାର ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍ ରେ ଯଥାବଶ୍ୟକ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ଯେପରି ବିହନ ଉପରେ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଚଢ଼ିପାରିବ । ବିହନରେ ଦ୍ରବଣ ମିଶାନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟେନର (ଡ୍ରମ୍/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ) କୁ ଘୂରାନ୍ତୁ ବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ବିହନ ଉପରେ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସାମାନ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରୁ କମ ସମୟ) । ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍ କୁ ଦ୍ରବଣ ରୂପେ ନିରନ୍ତର ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା କମର୍ସିଆଲ୍ ସୀଡ୍ ଡ୍ରେସିଙ୍ଗ ଉପକରଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

ମାତ୍ରା : ପ୍ରତି କେଜି ଜୋଆର ଓ ସୋୟବୀନ ବିହନ ପାଇଁ ୧.୦ ମି.ଲି. ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତି କେଜି କପା ବିହନ ପାଇଁ ୧.୫ ମି.ଲି. ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ।

ମିଶାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : କମ ମାତ୍ରା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାର ଫ୍ଲକ୍ସାପାଇରୋକ୍ସାଡ୍ ୩୩୩ ଜି/ଏଲ୍ ଏଫ୍ଏସ୍ ରେ ଯଥାବଶ୍ୟକ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ, ଯେପରି ବିହନ ଉପରେ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଚଢ଼ିବ । ବିହନରେ ଦ୍ରବଣ ମିଶାନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଟେନର୍ (ଡ୍ରମ୍/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ) କୁ ଘୂରାନ୍ତୁ ବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ବିହନ ଉପରେ ଏକସମାନ ଭାବେ ପୁଟ ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସାମାନ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରୁ କମ ସମୟ) ।

ବିଲରେ ପୁନଃପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ଅଣ-ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ପିଏଚ୍ଆଇ : ଅଣ-ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ବୁଣିବା ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ରୂପେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ସିଞ୍ଚନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍‌ସୀ ଓ ସର୍ବାଧିକ କେତେଥର : ବୁଣିବା ଆଗରୁ ଥରଟିଏ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ।

କୌଣସି ଫସଲରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଚିତ : ଏହା ଏକ ବିହନ ବିଶୋଧକ ଉତ୍ପାଦ, ତେଣୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଚିତ ।

ମହଜୁଦକରଣ : ୧. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଖାସ୍ କରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ବା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଖାଲି ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ୨. ଫିମ୍ପିନାଶକ ମହଜୁଦ କରାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀ ମଜବୁତ, ବାୟବୀୟ, ଆଲୋକିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଏହାର ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ନିରାପତ୍ତା ସତର୍କତା : ୧) ପାଣି ମିଶାଇବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଓ ଅଜାଡ଼ିକରି ବା ଛିଟିକିକରି ଦେହରେ ଲାଗିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । ଖାଲି ହାତରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୨) ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୁରା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରିକି ରବର ଦସ୍ତାନା, ଜୋତା, ମୁଖା ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ବା ରବର ଆପ୍ରନ୍ ଏବଂ ଟୋପି ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଦୁଃଶ୍ୱାସ ଓ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ରହିବା ଘଟିପାରେ ।

ପ୍ରଥମୋପଚାର : ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ । ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ସାବୁନ ଲଗାଇ ଭଲକରି ଧୁଅନ୍ତୁ । ଆଖିରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା ପାଣି ଗଡ଼ାଇ ଆଖି ମେଲା ରଖି ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ । ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ତୁଣ୍ଡ ଭଲକରି ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ୨୦୦-୩୦୦ ମି.ଲି. ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ମେଡିକାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ ।

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ : ବିଷବାଧା ହୋଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷଣାନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ ।

ସତର୍କବାଣୀ : ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ ବା ବୋତଲକୁ କୌଣସି କାମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟକୁ ନିରାପଦ ଭାବେବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : ୧. ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆ ପାଣିକୁ ନିରାପଦରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ । ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲରେ କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ୩. ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଉଚିତ ।

ଉତ୍ପାଦକ : ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ ଏଗ୍ରି-ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏସ୍.ଏ.ଏସ୍, ଜୋନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ ଲିଅନ୍ ନର୍ଡ, ରୁ ଜାକାର୍ଡ ୬୯୭୨୭, ଜିନେ ସେଡେକ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସ ।

ଆମଦାନିକାରୀ, ରି-ପ୍ୟାକିଙ୍ଗକାରୀ ଓ ବିପଣକ : ବିଏଏସ୍ଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ନିବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ପ୍ଲଟ୍ ନ. ୩୭, ଚାନ୍ଦିଭଲି ଫାର୍ମ ରୋଡ, ଚାନ୍ଦିଭଲି, ଅନ୍ଧେରୀ (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବଇ - ୪୦୦୦୭୨, ଭାରତ ।

କାରଖାନା : ୟୁନିଟ ନ. ୪, ଭିଲେଜ ନିମ୍ବୁଆ, ପି.ଓ. ମୁବାରକପୁର, ତହସିଲ ଡେରାବାସି, ଜିଲ୍ଲା ମୋହାଲି, ପଞ୍ଜାବ-୧୪୦୨୦୧ ।

Oriya

ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್

ಸಿಸ್ಟಿವಾ™

(ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ

ಸಿಸ್ಟಿವಾದಲ್ಲಿದೆ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್. ಇದು ಸೋರ್ಘಂನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥ್ರಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ, ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನ ರ್ಹಿಝೊಕ್ಟೋನಿಯಾ ಬೇರು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಲೆಡೊನರಿ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜಾಂಕುರದ ರೋಗ (ರ್ಹಿಝೊಕ್ಟೋನಿಯಾ).

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರಮಂಕ	ಘಟಕ	ಪ್ರಮಾಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ (ಗ್ರಾ/ಲೀ)
1	ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ ಸ. ಘ.	333
2	ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್–1,2,3 ಟ್ರಿಯಾಲ್	101
3	ಸಿ.ಐ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡ್ 48:2 (2–ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್‌ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಸಿಡ್, 4–ಫ(5–ಕ್ಲೋರೊ–4–ಮಿಥೈಲ್–ಸಲೊಫೋನಿಲ್)ಆಝೊ –3–ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ–, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್(1:1)	50
4	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ರಿಲಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೋಪೊಲಿಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೈಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	41
5	ಅಮೋನಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೊಲಿಆರಿಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	25
6	ಪೊಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ + ಫಿಲ್ಲರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಮಲ್ಶನ್	5.4
7	1,2–ಬೆಂಝಿಸೊಥಿಯಾಝೋಲಿನ್–3–ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ 2–ಮಿಥೈಲ್–4–ಐಸೊಥಿಯಾಝೋಲಿನ್–3–ಒನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ	3.7
8	ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	2.2
9	ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೈಡ್	0.3
10	ಪೂರ್ತಿ ಡೀ-ಆಯೊನೈಜ್ಡ್ ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
	ಒಟ್ಟು	1000.00

ಸಾಂದ್ರತೆ: 1.16 ಗ್ರಾ/ಲೀ

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು : ಬೀಜೋಪಚಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್ ಸೋರ್ಘಂನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥ್ರಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ, ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನ ರ್ಹಿಝೊಕ್ಟೋನಿಯಾ ಬೇರು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಲೆಡೊನರಿ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜಾಂಕುರದ ರೋಗ (ರ್ಹಿಝೊಕ್ಟೋನಿಯಾ), ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಕೆಜಿ ಬೀಜ			ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಮ್ಸ್)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ)	ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿಲೀ)	
ಸೋರ್ಘಂ	ಆ್ಯಂಥ್ರಕ್ನೋಸ್	0.33	1.0	ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು	ಅನ್ವಯಿಸದು (ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸರ್)
ಸೋಯಾಬೀನ್	ರ್ಹಿಝೊಕ್ಟೋನಿಯಾ ಬೇರು ಕೊಳೆತ, ಕೊಟಿಲೆಡೊನರಿ ಚುಕ್ಕೆ	0.33	1.0	ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು	ಅನ್ವಯಿಸದು (ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸರ್)
ಹತ್ತಿಯ	ಬೀಜಾಂಕುರದ ರೋಗ	0.49	1.5	ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು	ಅನ್ವಯಿಸದು (ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸರ್)

ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಜಲಚರಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಸೆಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ : ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್ ಒಂದು ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಾರದು.

ಮಣ್ಣು: ಉಪಚರಿತ ಬೀಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಜಾಂಕುರಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವ ಇರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿ, ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ, ನಾಝುಲ್‌ನ ಮಾದರಿ: ಚಿಕ್ಕ ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಆವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನ ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ವನ್ನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ (ಡ್ರಮ್/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್) ಸುತ್ತುಸುತ್ತಾಗಿ ತಿರುವಿರಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಆವರಣ ದೊರಕಿರುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.

ಡೋಸೇಜ್: ಸೋರ್ಘಂ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1.0 ಮಿಲೀ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್; ಹತ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 1.5 ಮಿಲೀ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್.

ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಚಿಕ್ಕ ಲಾಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ, ಆವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನ ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರೊಕ್ಸಾಡ್ 333 ಗ್ರಾ/ಲೀ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ವನ್ನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಸ್ಲರಿಯನ್ನು ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ (ಡ್ರಮ್/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್) ಸುತ್ತುಸುತ್ತಾಗಿ ತಿರುವಿರಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಆವರಣ ದೊರಕಿರುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿಎಚ್‌ಐ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ: ಇದನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿತ್ತನೆಯ ಮೊದಲು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾತ್ರ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದಾದ ಹಂತ : ಇದು ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಉತ್ಪಾದನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೇಖರಣೆ : 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು– ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಿರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿರಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ನೀರು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ತುಳುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ. 2. ಬಳಕೆದಾರರು ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್ಸ್, ಮೊಗಕಾಪು ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಎಪ್ರಾನ್‌ನಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪೋಷಾಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ಬಾಗುವುದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಒದಗಿಸಿರಿ. ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿ, ನೀರಿನ ಧಾರೆಗೊಡ್ಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆನಂತರ 200–300 ಮಿಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ: ವಿಷತಗಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಎಗ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್, ಝೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೆ ಲಿಯೊನ್ ನೊರ್ಡ್ ರ್ಯೂ ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ 69727 ಗಿನೆ ಸೀಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಆಮದು ಮಾಡಿ ರೀ-ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು : ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ : ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 37, ಚಾಂದಿವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ರೋಡ್, ಚಾಂದಿವಲಿ, ಅಂಧೇರಿ (ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ–400072, ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಯುನಿಟ್ ನಂ. 4, ನಿಂಬುವಾ ಗ್ರಾಮ, ಪಿ.ಓ. ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರ್ ದೇರಾ ಬಸ್ಸಿ ತೆಹಸಿಲ್, ಮೊಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಂಜಾಬ್–140201.

Kanada

ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్

సిస్టివా™

(విత్తన శుద్ధి కోసం శిలీంధ్రనాశని)

వాడుటకు ముందు కరపత్రమును చదవండి

సిస్టివాలో ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఉంది. జొన్నలో ఆంత్రాక్‌నోస్, సోయాబీన్‌లో రైజోక్టోనియా కుళ్ళుడు మరియు మొలకెత్తిన గింజలపై మచ్చ మరియు ప్రత్తిలో విత్తనాల వ్యాధి (రైజోక్టోనియా) నియంత్రించేందుకు విత్తన చికిత్స శిలీంధ్రనాశినిగా ఇది చాలా ప్రభావవంతమైనది.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ప.సంఖ్య	పదార్థం	కంటెంట్ బ/వ (గ్రా/లీ)
1	ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ ఎ.ఐ.	333
2	ప్రొపేన్-1, 2, 3 ట్రయోల్	101
3	సి.ఐ. పిగ్మెంట్ రెడ్ 48:2 (2-నాఫ్తాలీన్‌కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్, 4-(5-క్లోరో-4-మిథైల్-2-సల్ఫోఫెనైల్)అజో-3-హైడ్రోక్సీ-, క్యాల్షియం లవణం (1:1)	50
4	నీటిలో మరియు ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్‌లో అక్రిలిక్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్	41
5	అమ్మోనియం సాల్ట్ పాలిఆరైల్‌ఫెనైల్ ఇథర్ సల్ఫేట్	25
6	పాలిడైమిథైల్‌సిలొక్సేన్ + ఫిల్లర్, నీటిలో ఎమల్షన్	5.4
7	అక్వియస్ సాల్యూషన్‌లో 1, 2-బెంజిసొథియాజోలిన్-3-వన్ ప్లస్ 2-మిథైల్-4-ఐసొథియాజోలిన్-3-ఒన్	3.7
8	జాంథమ్ గమ్	2.2
9	సోడియం హైడ్రాక్సైడ్	0.3
10	సంపూర్ణంగా డీ-అయోడైజ్ నీళ్ళు	కావలసినన్ని
	మొత్తం	1000.00

సాంద్రత: 1.16 గ్రా/మి.లీ.

వినియోగించుట మరియు ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు: విత్తన చికిత్సగా ఈ కింద ఇవ్వబడిన సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, జొన్నలో ఆంత్రాక్‌నోస్, సోయాబీన్‌లో రైజోక్టోనియా కుళ్ళుడు మరియు మొలకెత్తిన గింజలపై మచ్చ మరియు ప్రత్తిలో విత్తనాల వ్యాధిని (రైజోక్టోనియా) ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్ బాగా నియంత్రిస్తుంది.

పంట	తెలుగు మామూలు పేరు	కిలో విత్తనాలకు మోతాదు			పేచివుండవలసిన కాలం (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	పిచికారి ద్రావణం తయారుచేయడానికి కావలసిన నీటి పరిమాణం (మి.లీ)	
జొన్న	ఆంత్రాక్‌నోస్	0.33	1.0	విత్తనాలకు సమంగా కోట్ వేసేందుకు సరిపోతుంది	వర్తించదు (విత్తన డ్రెస్సర్)
సోయాబీన్	రైజోక్టోనియా వేరు కుళ్ళుడు, మొలకెత్తిన గింజలపై మచ్చ	0.33	1.0	విత్తనాలకు సమంగా కోట్ వేసేందుకు సరిపోతుంది	వర్తించదు (విత్తన డ్రెస్సర్)
ప్రత్తి	విత్తన వ్యాధి	0.49	1.5	విత్తనాలకు సమంగా కోట్ వేసేందుకు సరిపోతుంది	వర్తించదు (విత్తన డ్రెస్సర్)

ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన పంటలకు కాకుండా ఇతర వాటికి ఉపయోగించకూడదు.

ఆక్వాటిక్ జీవులకు ఉత్పాదన విషపూరితం. నీటి వనరుల దగ్గరలో ఉపయోగించకండి.

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ : ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్ అనేది శిలీంధ్రనాశని మరియు పంట విత్తడానికి ముందు విత్తన చికిత్సగా ఉపయోగించాలి.

వాతావరణ పరిస్థితులు : వాతావరణ పరిస్థితులు వినియోగంపై ప్రభావం చూపవు.

నేల : చికిత్స చేసిన విత్తనాల మొలకెత్తుట కోసం నేలలో బాగా తేమ నిర్వహిస్తుంది.

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్, పరికరాల రకం, నాజిల్ రకం : చిన్న లాట్‌ల కోసం, విత్తనాలకు సమంగా కోట్ వేసేందుకు తగినంత నీటికి ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్ ఉత్పాదనను కావలసిన పరిమాణంలో మిశ్రమం చేయండి. బురదను విత్తనాలకు కలిపి వాటికి సమంగా కోటింగ్ అయ్యేంత వరకు (సాధారణంగా నిమిషం కంటే తక్కువ సమయం) కంటెయినర్‌ని (డ్రమ్/ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్) తిప్పండి లేదా కలియబెట్టండి. నిరంతరం ఆపరేట్ చేసే వాణిజ్య విత్తన డ్రెస్సింగ్ పరికరాలతో వినియోగించేందుకు బురదగా కూడా ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్‌ని ఉపయోగించవచ్చు.

మోతాదు : జొన్న మరియు సోయాబీన్‌లో ప్రతి కిలో విత్తనాలకు 1.0 మి.లీ ఫార్ములేషన్, ప్రత్తిలో ప్రతి కిలో విత్తనాలకు 1,5 మి.లీ ఫార్ములేషన్.

మిశ్రమం చేసేందుకు సూచన : చిన్న లాట్‌ల కోసం, విత్తనాలకు సమంగా కోట్ వేసేందుకు తగినంత నీటికి ఫ్లుక్సాపైరోక్సాడ్ 333 జి/ఎల్ ఎఫ్ఎస్ ఉత్పాదనను కావలసిన పరిమాణంలో మిశ్రమం చేయండి. బురదను విత్తనాలకు కలిపి వాటికి సమంగా కోటింగ్ అయ్యేంత వరకు (సాధారణంగా నిమిషం కంటే తక్కువ సమయం) కంటెయినర్‌ని (డ్రమ్/ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్) తిప్పండి లేదా కలియబెట్టండి.

పునఃప్రవేశ కాలం : వర్తించదు.

పిహెచ్ఐ : వర్తించదు.

వినియోగించవలసిన సమయం : విత్తడానికి ముందు విత్తన చికిత్సగా దీనిని ఉపయోగించాలి.

గరిష్ఠ పిచికారిల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం : విత్తడానికి ముందు ఒకే ఒకసారి విత్తన చికిత్స.

ఏ పంటపై కూడా శిలీంధ్రనాశనిని వినియోగించకూడని దశలు : ఇది విత్తన చికిత్స ఉత్పాదన మరియు ఆకులపై వినియోగించకూడదు.

నిల్వ : 1. శిలీంధ్రనాశని ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువులను, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా వేరే గదులు లేదా ఆవరణలో నిల్వ చేయాలి లేదా శిలీంధ్రనాశని స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి వేరే అల్మరాల్లో తాళం వేసి ఉంచాలి. 2. శిలీంధ్రనాశనిని నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలు నీటి ఆవిరితో కలుషితం కావడాన్ని నివారించేందుకు బాగా నిర్మించినవై, గాలి సోకేవై, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ ఉన్నవై మరియు తగినంత చుట్టు కొలతలతో నిర్మించినవై ఉండాలి.

సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు : 1. మందు కలిపేటప్పుడు కారిపోవడం లేదా చిందిపోవడం వల్ల పీల్చకండి మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. ఒట్టి చేతులతో మిశ్రమం చేయకండి. 2. వాడకందారు సంపూర్ణ రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి, వీటిల్లో రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు, ముఖ కవచం మరియు సమగ్ర లేదా రబ్బరు అప్రాన్ లేదా టోపీ ఉంటాయి.

విషపు లక్షణాలు : ప్రారంభ లక్షణాల్లో ఆయాసం మరియు ఆందోళన పడటం సమ్మేళనం ఏదైనా ఉండొచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స : మలినపడిన దుస్తులు మార్చండి. పీల్చితే, రోగిని మౌనంగా ఉంచండి, తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి, వైద్య చికిత్స కోరండి. చర్మానికి తగిలితే, సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగండి. కళ్ళకు తగిలితే, కనురెప్పలను తెరిచి కొళాయి నీటిని కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కళ్ళకు చల్లుకోండి. మింగితే, వెంటనే నోటిని కడిగేయండి మరియు 200–300 మి.లీ నీటిని తాగండి. వైద్య చికిత్స చేయించుకోండి.

ఫిజీషియన్‌కి సలహా : ఒకవేళ పాయిజనింగ్ కలిగితే లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

విరుగుడు : తెలిసిన నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు.

హెచ్చరిక : ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

వాడిన డబ్బాలను సురక్షితంగా విసర్జించుట : 1. ప్యాకేజిలని లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యంలను నిరోధించేందుకు వీలుగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజిలని మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజిలని పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

తయారుచేసినవారు: బిఎఎస్ఎఫ్ అగ్రి-ప్రొడక్షన్ ఎస్.ఎ.ఎస్., జోన్ ఇండస్ట్రియల్ లైయాన్ నార్డ్, రూయి జక్వార్డ్, 69727 జెనయ్ సెడెక్స్, ఫ్రాన్స్.

దిగుమతి చేసుకున్నది, మళ్ళీ ప్యాక్ చేసినది మరియు మార్కెట్ చేసినది: బిఎఎస్ఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్,

రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: ప్లాట్ సం. 37, చాందివిలి ఫామ్ రోడ్డు, చాందివిలి, అంధేరి (ఈస్ట్), ముంబయి–400072, ఇండియా.

ఫ్యాక్టరీ: యూనిట్ సం. 4, నింబువా గ్రామం, పి.ఒ. ముబారక్‌పూర్, డెరా బస్సీ తాలూకా, మొహాలి జిల్లా, పంజాబ్ –140201

Telugu

ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 G/L FS

சிஸ்டிவா™

(விதை நேர்த்திக்கான பூஞ்சாணக் கொல்லி)

பயன்படுத்தும் முன்பு கையேட்டை படியுங்கள்

சிஸ்டிவாவில் 333 கிராம்/லி. ஃப்ளுக்ஸாபைரோக்ஸைடு அடங்கியுள்ளது. இது சோளத்தில் ஆந்த்ராக்னோஸ் நோய், சோயாபீன் பயிரில் ரிஜோக்டோனியா வேர் அழுகல் மற்றும் கோட்டிலிடோனரி புள்ளி நோய் மற்றும் பருத்தியில் வேர் அழுகல் (ரிஜோக்டோனியா) கட்டுப்படுத்த விதை நேர்த்தி பூஞ்சாணக் கொல்லியாக மிக ஆற்றலோடு செயல்படுகிறது.

இரசாயனக் கலவை:

வ. எண்.	பகுதி பொருள்	அடக்கம் w/v (g/l)
1	ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு தீ.மூ.	333
2	ப்ரொப்பன்-1,2,3 டிரைல்	101
3.	சி.ஐ. பிக்மெண்ட் ரெட் 48:2 (2-நாப்தலின்கார்போஸைலிக் ஆசிட், 4-[(5-குளோரோ-4-மெதைல்-2-சல்ஃபோபெனைல்)அஜோசி-3- ஹைட்ராக்ஸி,- கால்சியம் சால்ட் (1:1)	50
4	தண்ணீரில் அக்ரலிக் கிராஃப்ட் கோபாலிமர் மற்றும் புரோபைலைன் கிளைகோல்	41
5	அம்மோனியம் சால்ட் பாலிஆரில்பெனைல் ஈதர் சல்பேட்	25
6	பாலிடைமெதைல்சிலோக்ஸேன் + ஃபில்லர், தண்ணீரில் எமல்ஷன்	5.4
7	1,2 -பென்ஜிசோதியாஜோலின்-3- ஒன் ப்ளஸ் 2-மெதைல்-4-இஸோதியாஜோலின்-3-அக்வியஸ் சொல்யூஷன்	3.7
8	ஷாந்தன் கம்	2.2
9	சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு	0.3
10	முழுவதும் டி-அயோனைஸ்டு செய்யப்பட்ட தண்ணீர்	Q.S
	மொத்தம்	1000.00

அடர்த்தி: 1.16கிராம்/மில்லி

தெளிப்பு மற்றும் பயன்படுத்த பரிந்துரை: விதை நேர்த்திக்காக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளின்படி பயன்படுத்தும்போது ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 ஜி/எல் எஃப்எஸ்சோளத்தில் ஆந்த்ராக்னோஸ் நோய், சோயாபீன் பயிரில் ரிஜோக்டோனியா வேர் அழுகல் மற்றும் கோட்டிலிடோனரி புள்ளி நோய் மற்றும் பருத்தியில் வேர் அழுகல் (ரிஜோக்டோனியா) ஆற்றலுடன் கட்டுப்படுத்துகிறது.

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	விதையின் அளவு / கிலோ			காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்கள்)	மருந்து (மி.லி.)	கலவையை உருவாக்க தேவைப்படும் தண்ணீர் அளவு (மி.லி.)	
சோளம்	ஆந்த்ராக்னோஸ்	0.33	1.0	விதைகள் மீது சீராக பூச்சு செய்ய போதுமானது	பொருந்தாது (விதை டிரஸ்ஸர்)
சோயாபீன்	ரிஜோக்டோனியா வேர் அழுகல் மற்றும் கோட்டிலிடோனரி புள்ளி நோய்	0.33	1.0	விதைகள் மீது சீராக பூச்சு செய்ய போதுமானது	பொருந்தாது (விதை டிரஸ்ஸர்)
பருத்தி	நாற்று நோய்	0.49	1.5	விதைகள் மீது சீராக பூச்சு செய்ய போதுமானது	பொருந்தாது (விதை டிரஸ்ஸர்)

இந்த லேபிளில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவை தவிர இதர பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

இந்த தயாரிப்பு நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு விஷ பாதிப்பு கொண்டது. எனவே நீர் நிலைகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்தாதீர்கள்.

தெளிப்பு வேளை மற்றும் பயிர் நிலை: ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 ஜி/எல் எஃப்எஸ் பயிரை நடும் முன்பு விதை நேர்த்தியாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பூஞ்சாணக் கொல்லி.

பருவ கால நிலைகள்: பருவ கால நிலை எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.

மண்: விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட விதைகள் முளைப்புக்காக நிலத்தில் நல்ல ஈரப்பதத்தை பராமரியுங்கள்.

தெளிக்கும் முறை, கருவி வகை, நாசில் வகை: குறைந்த அளவு விதைகளுக்கு ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 ஜி/எல் எஃப்எஸ் தயாரிப்பை போதிய அளவு எடுத்துக் கொண்டு விதைகளை சீராக பூச்சு செய்வதற்கு போதிய தண்ணீர் உடன் கலந்து கொள்ளுங்கள். விதைகளுடன் இந்த கலவையை சேர்த்து விதைகளில் சீராக கலவை பூச்சு படியும் வரை (பொதுவாக ஒரு நிமிடத்திற்கும் குறைந்த நேரம்) கன்டெய்னர்களை (டிரம்/பிளாஸ்டிக் பேக்) சுழற்றுங்கள் அல்லது கலக்குங்கள். ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 ஜி/எல் எஃப்எஸ்-ஐ கலவையை தொடர்ந்து இயக்கும் வணிக ரீதியான விதை நேர்த்தி கருவிகளுடன் பயன்படுத்தலாம்.

அளவு: சோளம் மற்றும் சோயாபீன்-க்கு 1 கிலோ விதைக்கு 1.0 மில்லி மருந்து; பருத்தியில் 1 கிலோ விதைகளுக்கு 1.5 மி.லி. மருந்து.

கலப்பதற்கான குறிப்புக்கள்: குறைந்த அளவு விதைகளுக்கு ஃப்ளுக்ஸாபைராக்ஸைடு 333 ஜி/எல் எஃப்எஸ் தயாரிப்பை போதிய அளவு எடுத்துக் கொண்டு விதைகளை சீராக பூச்சு செய்வதற்கு போதிய தண்ணீர் உடன் கலந்து கொள்ளுங்கள். விதைகளுடன் இந்த கலவையை சேர்த்து விதைகளில் சீராக கலவை பூச்சு படியும் வரை (பொதுவாக ஒரு நிமிடத்திற்கும் குறைந்த நேரம்) கன்டெய்னர்களை (டிரம்/பிளாஸ்டிக் பேக்) சுழற்றுங்கள் அல்லது கலக்குங்கள். **மறு நுழைவு காலம்:** உரித்தாகாது

PHI: உரித்தாகாது

தெளிப்பு வேளை: விதைப்பதற்கு முன்பு விதை நேர்த்தி செய்ய இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அதிகபட்ச எண்ணிக்கை தெளிப்புகள் உட்பட தெளிக்கும் முறை: விதைப்பதற்கு முன்பு ஒரே ஒரு முறை விதை நேர்த்தி

எந்த பயிரின் மீதும் பூஞ்சாணக் கொல்லி தெளிக்கப்படக் கூடாத நிலைகள்: இது ஒரு விதை நேர்த்தி தயாரிப்பு மற்றும் இலைகள் மீது தெளிப்பாக இது தெளிக்கப்படக் கூடாது.

பத்திரப்படுத்த விதிகள்: 1. பூஞ்சணங் கொல்லி உள்ள டப்பாக்களை இதர பொருட்களை, குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை பத்திரப்படுத்தும் அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் இருந்து தூரத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். அல்லது பூஞ்சணங் கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கலாம். 2. பூஞ்சணங் கொல்லி டப்பாக்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்படும் இடம் நல்ல கட்டுமானம், நல்ல வெளிச்சம், உலர்வு நல்ல காற்றோட்டம் உடன் மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாசுபடுத்தாமல் தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவுடனும் இருக்க வேண்டும்

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. கரைக்கும் போது சிந்தி சிதறுதல் காரணமாக உட்வாசித்தல், சருமத்தில் படுவதை தவிருங்கள், வெறும் கைகளால் கலக்காதீர்கள். 2. பயன்படுத்துபவர் ரப்பர் கை உறைகள், பூட்ஸ்கள், முக கவசம் மற்றும் ஓவர் ஆல் அல்லது ரப்பர், ஏப்ரான், தொப்பி உட்பட முழுமையாக பாதுகாப்பு தரும் ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: ஆரம்ப அறிகுறிகள் குரல் மாற்றம் மற்றும் பயத்தால் நடுங்குதல் இவற்றின் சேர்க்கையாக இருக்கலாம்.

முதலுதவி: மருந்து பட்ட ஆடைகளை அகற்றுங்கள். மருந்தை உட்சுவாசித்திருந்தால் நோயாளியை அமைதிப்படுத்தி காற்றோட்டமான இடத்திற்கு கொண்டு சென்று மருத்துவ கவனிப்பு அளியுங்கள் அல்லது சருமத்தில் பட்டிருந்தால் சோப் மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யுங்கள். கண்களில் பட்டிருந்தால் கண் விழிகளை நன்கு திறந்து வைத்தபடி குழாயிலிருந்து விழும் தண்ணீரில் குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்கள் நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யுங்கள். உடலினுள் சென்றிருந்தால் உடனடியாக வாயை தண்ணீரால் கொப்பளித்து அதன்பின் 200-300 மில்லி தண்ணீர் குடிக்க வையுங்கள். அதன் பின்பு மருத்துவ கவனிப்பு அவசியம்.

மருத்துவருக்கான ஆலோசனை குறிப்பு: விஷ பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளியுங்கள்.

விஷ முறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு மருந்து ஏதுமில்லை.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்துவது அபாயம்.

காலிபாத்திரங்களைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்: 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது. 3. காலி டப்பாக்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

உற்பத்தியாளர்: பிஏஎஸ்எஃப் அக்ரி-புரடக்ஷன் எஸ்.ஏ.எஸ். ஜோன் இண்டஸ்ட்ரியலி லியான் நார்டு. ரு ஜாக்குவார்டு 69727, ஜினே செடெக்ஸ், ஃபிரான்ஸ்.

இறக்குமதி செய்வோர், மறுபேக் செய்டோர் மற்றும் வர்த்தகம் செய்வோர்: பிஏஎஸ்எஃப் இந்தியா லிமிடெட். பதிவு அலுவலகம் : பிளாட் நம்பர் 37, சாந்திவலி ஃபாம் ரோடு, சாந்திவலி, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை-400 072. இந்தியா.

தொழிற்சாலை: யூனிட் நம்பர் 4, வில்லேஜ் நிம்புவா, போஸ்ட் முபாரக்பூர்-140201, டேரா பஸி தாலுகா, மொகாலி மாவட்டம், பஞ்சாப்.

Tamil

فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس

™سِــســـٹـائـیـوا

(بیجوں پر تعامل کے لئے پھپھوند کش دوا)

استعمال سے پہلے ہدایات کی پرچی پڑھ لیں

سِسـٹـائیو میں گرام فی لیٹر فلکزاپائیورکزاڈ موجود ہوتا ہے۔ جوار کی فصل میں اینتھریکنوز بیماری، سویابین کی فصل میں رھائیزوکٹونیا جڑوں میں سڑن کی بیماری اور کوٹیلیڈونری دھبے اور کپاس میں سیڈلنگ بیماری (رھائیزوکٹونیا) بیماری پر نہایت پُر اثر طور پر قابو پانے میں بیجوں پر تعامل کے لئے نہایت یہ نہایت کارگر ہے۔

کیمیائی اجزاء:

نمبر شمار	اجزاء	مقدار ڈبلیو/وی (جی/ایل)
1	فلکزاپائیورکزاڈ اے. آئی.	333
2	پروپین-1,2,3ٹرائیول	101
3	سی. آئی. پگمنٹ ریڈ 48:2 (2۔نیفتھالین کاربوکزائلک ایسڈ، 4۔[(5۔کلورو ۔4۔میتھائیل۔2۔سلفو فینائیل)ایزو]۔3۔ہائیڈروکزی۔، کیلشیم سالٹ (1:1)	50
4	پانی اور پروپیلین گلائیکول میں ایکریلک گرافٹ کو پولیمر	41
5	امونیم سالٹ پولی ارِل فینائیل ایتھر سلفیٹ	25
6	پولی ڈائی میتھائیل سیلوکزین + پُر کرنے والا مادہ، پانی میں اِملشن	5.4
7	1,2۔بینزیسو تھائیازولین۔3۔وَن پلس 2۔میتھائیل۔4۔ آئیسو تھائیا زولین۔3۔وَن پانی کے محلول میں	3.7
8	زینتھم گوند	2.2
9	سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ	0.3
10	مکمل طور ڈی آئیونائیزڈپانی	مناسب مقدار میں
	کُــل	1000.0

کثافت : 1.16 گرام / ملی لیٹر

دوا کے استعمال اور چھڑکاؤ سے متعلق ہدایات : درج ذیل ہدایات کے مطابق استعمال کرنے پر فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس جوار کی فصل میں اینتھریکنوز بیماری ، سویابین کی فصل میں رھائیزوکٹونیا جڑوں میں سڑن کی بیماری اور کوٹیلیڈونری دھبے اور کپاس میں سیڈلنگ بیماری (رھائیزوکٹونیا) بیماری پر بہتر قابو فراہم کرتا ہے۔

فصل	بیماری کا عام نام	مقدار / کلو گرام بیج			انتظار کا وقفہ (دنوں میں)
		اے. آئی. (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)	آمیزہ تیار کرنے کے لئے پانی کی ضروری مقدار (ملی لیٹر)	
جوار	اینتھریکنوز	0.33	1.0	بیجوں پر یکساں پرت کے لئے کافی	لاگو نہیں (بیجوں پر پرت)
سویابین	رائیزوکٹونیا جڑوں میں سڑن	0.33	1.0	بیجوں پر یکساں پرت کے لئے کافی	لاگو نہیں (بیجوں پر پرت)
کپاس	سیڈلنگ بیماری	0.49	1.5	بیجوں پر یکساں پرت کے لئے کافی	لاگو نہیں (بیجوں پر پرت)

ہدایات کی اس پرچی/ لیبل میں درج فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر اس دوا کا استعمال نہ کریں۔

یہ دوا آبی جانداروں کے لئے زہریلا اثر رکھتی ہے ۔ اس لئے اس دوا کو پانی کے ذخیروں کے قریب نہیں استعمال نہیں کرنا چاھئیے۔

دوا کے چھڑکاؤ کا وقت اور فصل کا مرحلہ : فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس ایک پھپھوند کش دوا ہے جس کا استعمال فصل کے بیج بونے سے پہلے بیجوں پر تعامل کے لئے کیا جا تا ہے۔

موسمی کیفیات : موسمی کیفیات کو دوا کے چھڑکاؤ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

مٹی : تعامل شدہ بیجوں کی اچھی نمود کے لئے مٹی میں بہتر مرطوبیت برقرار رکھیں۔

دوا کے چھڑکاؤ کی تکنیک، مشینیں اور نونٹی کی قسم : تھوڑی مقدار میں محلول تیار کرنے کے لئے دوا فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس کی ضروری مقدار پیمائش کرکے نکال لیں اور اسے پانی کی مناسب مقدار میں مکس کریں تاکہ تمام بیجوں پر دوا کا ایک یکساں کوٹ لگ جائے۔ اس آمیزے کو بیج پر ڈال دیں اور ڈبے (ڈرم / پلاسٹک بیگ) کو ھلائیں یا گھمائیں جب تک تمام بیجوں پر دوا کی ایک یکساں پرت لگ نہ جائے (اس میں ایک منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے)۔ا فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس کو ایک آمیزے کی حیثیت سے بھی لگاتار کام کرنے والے بیج پر کوٹ لگانے والی کاروباری مشینوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مقدار : 1.0 ملی لیٹر فارمیولیشن ایک کلو گرام جوار اور سویابین کے بیجوں کے لئے ، کپاس کے ہر ایک کلو گرام بیج پر 1.5 ملی لیٹر فارمیولیشن۔

دوا مکس کرنے کے لئے ہدایات : تھوڑی مقدار میں محلول تیار کرنے کے لئے دوا فلکزاپائیورکزاڈ 333 گرام فی لیٹر ایف ایس کی ضروری مقدار پیمائش کرکے نکال لیں اور اسے پانی کی مناسب مقدار میں مکس کریں تاکہ تمام بیجوں پر دوا کا ایک یکساں کوٹ لگ جائے۔ اس آمیزے کو بیج پر ڈال دیں اور ڈبے (ڈرم / پلاسٹک بیگ) کو ھلائیں یا گھمائیں جب تک تمام بیجوں پر دوا کی ایک یکساں پرت لگ نہ جائے (اس میں ایک منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے)۔

دوا کے دوبارہ چھڑکاؤ کی مدت : لاگو نہیں۔

پی ایچ آئی : لاگو نہیں۔

دوا کے چھڑکاؤ کا وقت : اس دوا کا استعمال بیج بونے سے پہلے بیجوں پر تعامل کے لئے کیا جاتاہے۔

دوا کے چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ مقدار اور تواتر : بیج بونے سے پہلے بیجوں پر تعامل کے لئے۔

وہ مرحلہ جس میں کسی بھی فصل پر پھپھوند کش دوا کااستعمال نہیں کرنا چاھئیے : اس دوا کا استعمال بیجوں پر تعامل کے لئے ہوتا ہے، اس لئے اس کا استعمال پتوں پر نہیں کیا جانا چاہئیے۔

ذخیرہ اندوزی : 1. دیگر اشیا، خصوصاً کھانے پینے کی اشیا، ذخیرہ کرنے والے کمروں اور احاطوں سے پھپھوند کش دوا کے تھیلوں کو علیحدہ کمرے یا احاطے میں رکھا جائے یا پھر پھپھوند کش دوا کی مقدار اور نوعیت کے مطابق انہیں علیحدہ کمرے یا الماری میں تالا لگا کر رکھا جائے۔ 2. ہوا کی مرطوبیت سے دوا کو خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کیلئے دوا رکھنے کیلئے بنائے گئے کمرے عمدہ تعمیر کردہ، روشن، ہوا دار اور مناسب لمبائی و چوڑائی کے ہونے چاہئیں۔

احـتـیـاطی تدابیر : 1. دوا کا محلول تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کی دوا چھلک کر یا گرکر آپ کی جلد سے مَس نہ ہوجائے یا سانسوں میں نہ داخل ہوجائے۔ ننگے ہاتھوں سے دوا مکس نہ کریں۔ 2. دوا کا استعمال کرنے والے شخص کو مکمل حفاظتی کپڑے، جن میں ربر کے دستانے، جوتے، چہرے کا ماسک، مکمل جسم ڈھانک نے والا کپڑا، ربر ایپرن یا ہیٹ شامل ہیں۔

زهـر خـوراکی کی عـلامات : ابتدائی علامات میں ان میں سے کوئی ایک یا کئی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں : سانس پھولنااور کندھے جھک جانا۔

ابـتـدائی طبی مدد : دوا سے متاثر کپڑوں کو اُتار دیں۔ اگر دوا سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوجائے تو مریض کو پُرسکون رکھیں، تازی ہوا میں لے جائیں اور طبی امداد حاصل کریں۔ دوا سے متاثر جلد کو صابن اور پانی سے خوب اچھی طرح دھوئیں۔ اگر آنکھیں متاثر ہوئی ہوں، تو بہتے ہوئے پانی میں 15 منٹ تک آنکھیں کھول کر خوب اچھی طرح دھوئیں۔ اگر دوا غلطی سے کھالی گئی ہوتوکُلی کرتے ہوئے منہ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، اور فوراً 200۔300 ملی لیٹر پانی پئیں۔ طبی امداد حاصل کریں۔

ڈاکـٹـر کے لـئے ہـدایـت : زہر خوراکی کی صورت میں علامات کے مطابق مریض کا علاج کریں۔

تـریـاق : کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے۔

انـتـبـاه : دوا کے خالی ڈبوں کو دوبارہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔

دوا کے استـعـمـال شـده ڈبـوں کـو مـحـفـوظ طـریـقـے سـے تـلـف کـرنـا : 1. ماحول اور پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کیلئے استعمال شدہ دوایا خالی ڈبے، زائد اور بچے ہوئے سامان اورڈبے اور مشین کا دھویا ہوا پانی اور استعمال شدہ پانی کو مناسب طریقے سے ضائع کریں۔ 2. خالی ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ 3. خالی ڈبوں کو توڑ کر انھیں آبادی سے دور گاڑ دیں۔

تـیـار کـنـنـده : بی اے ایس ایف ایگری پروڈکشن ایس. اے. ایس، زون انڈسٹریل لیان نورڈ، ریو جیکوارڈ، 69727، جینے سیڈیکس، فرانس۔

درآمد، دوبارہ پیـکـنـگ اور تـشـهـیـر کـرده : بی اے ایس ایف انـڈیـا لـمـیـنـیـڈ،

رجـسـٹـرڈ آفـس : پلاٹ نمبر37، چاندیولی فارم روڈ، چاندیولی، اندھیری (ایسٹ)، ممبئی ـ 400072، انڈیا۔

فـیـکـٹـری : یونٹ نمبر4، نمبس گاؤں، پی. او. مبارک پور، تحصیل ڈیرابسی، ضلع موہالی، پنجاب ـ 140201۔

Kashmiri

F2161
Purab

Actual Size : 310mm (W) x 215mm (H)