Size : 550mm(W)X350mm(H)

Triticonazole 80 g/l + Pyraclostrobin 40 g/l (w/v) FS

Insure® Perform

Fungicide for Seed Treatment
Read Leaflet before use
For Agricultural use

Insure Perform 120 g/l w/v FS contains 80 g/l of Triticonazole and 40 g/l of Pyraclostrobin as active ingredients. It is a very effective fungicide used as seed treatment for the control of loose smut disease in Wheat.

Chemical composition:

Sr. No.	Ingredient	Content w/v (g/l)
1	Triticonazole a.i.	80.00
2	Pyraclostrobin a.i.	40.00
3	preparation of calcium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl) azo]-3-hydroxy-2-naphthoate	120.00
4	propane-1,2,3 triol, (Glycerol)	100.00
5	ammonium salt of polyarylphenyl ether sulfate	47.00
6	acrylic graft copolymer in water and propylene glycol	27.00
7	1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3-one in aq. solution	5.50
8	polydimethylsiloxanes 30% in aqueous emulsion	4.40
9	Heteropolysaccharide (Xantham gum)	3.00
10	sulfuric acid, 50% solution in water	0.50
11	water	q.s.
	Total	**1000.00**

Density: 1.12 g/cm³

Crop	Common name of the disease	Dosage per Kg of seed			Waiting period from Seed Treatment to harvest (in days)
		a.i (g)	Formulation (ml)	Quantity of Water required to Make Slurry (ml)	
Wheat	Loose smut	0.12	1.0	Sufficient to coat the seeds uniformly	NA (Seed Dresser)

DIRECTIONS FOR USE, STORAGE AND PERSONAL PROTECTION EQUIPMENTS TO BE USED

DIRECTIONS FOR USE: For small lots, mix the required quantity of the product Triticonazole 80 g/l + Pyraclostrobin 40 g/l (w/v) FS (Insure Perform 120 g/l FS) with water sufficient to coat the seeds uniformly. Add the slurry to the seed and rotate or stir the container (drum / plastic bag) until the seeds are uniformly covered (usually less than a minute). Triticonazole 80 g/l + Pyraclostrobin 40 g/l (w/v) FS (Insure Perform 120 g/l FS) can also be used as slurry for application with continuously operating commercial seed dressing equipment's.

Time of Application and crop stage: Preventive application for seed and soil borne diseases before sowing/planting of seed /tuber

Weather conditions: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

Soil: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

Application technique, equipment type, nozzle type: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

Dosage: Wheat (1 ml/ kg seed).

Instruction for mixing: Sufficient to coat the seeds uniformly of seeds to be treated.

Re-entry period: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

PHI: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

Application timing: Before sowing/Transplanting of seed.

Frequency including maximum number of sprays: Not Applicable as product to be used for seed treatment only.

Stages during which product should not be applied on any crop: Not Applicable as product to be used for seed treatment only

Storage : 1.The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat.

Disposal of containers : 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Poisoning symptoms : May produce an allergic reaction.

First aid : In case of ingestion, rinse mouth immediately and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention immediately. Remove contaminated clothes immediately. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention. On skin contact, wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. In case of eye contact, wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

Antidote : There is no known specific antidote. Treat the patient according to the symptoms (decontamination, vital function).

Cautionary Statement- 1. Product is toxic to fish and thus the product containing the molecules may be avoided near aquaculture". 2. Farmers are advised to avoid repeated use of different members of two fungicide classes to avoid development of resistant in their diseases management programmes". 3. Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet. 4. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Manufactured by: BASF Agri-Production S.A.S., Zone Industrielle Lyon Nord, Rue Jacquard, 69727, Genay Cedex, France. **Imported, Re-packed & Marketed by: BASF India Limited** , **Registered office:** BASF India Limited, Plot no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali, Andheri (E), Mumbai - 400072, India. **Factory:** Unit No. 4 , Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali , Punjab.

English

ट्रिटिकोनेझोल ८० ग्रा./लीटर + पाइरेक्लोस्ट्रोबिन ४० ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस

इंश्योर™ परफॉर्म

(बीजोपचार के लिए फफूंदनाशक)
प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले
कृषि उपयोग के लिए

इंश्योर परफॉर्म 120 ग्रा./ली डब्ल्यू/वी एफएस में सक्रिय घटक के रूप में 80 ग्रा./लीटर ट्रिटिकोनेझोल और 40 ग्रा./लीटर पाइरेक्लोस्ट्रोबिन होता है। यह एक बेहद प्रभावी फफूँदनाशक है जो गेहूँ में अनावृत कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए बीजोपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

क्रमांक	सामग्री	मात्रा डब्ल्यू/वी (ग्रा./ली.)
1	ट्रिटिकोनेझोल ए.आई.	80.00
2	पाइरेक्लोस्ट्रोबिन ए.आई.	40.00
3	कैल्शियम 4–[(5–क्लोरो–4–मेथिल–2–अल्फोनेटोफेनिल)एज़ो] –3–हाइड्रॉक्सी–2–नेफ्थोएट का मिश्रण	120.00
4	प्रोपेन–1,2,3 ट्रायोल (ग्लॉसेरोल)	100.00
5	पॉलीऐरिल्फेनिल इथर सल्फेट का अमोनियम साल्ट	47.00
6	पानी में एक्रीलिक ग्राफ्ट कोपोलिमर और प्रोपीलिन ग्लायकोल	27.00
7	जलीय विलयन में 1,2–बेंज़िसोथिएझोलिन–3–वन प्लस 2–मेथिल–4–आइसोथिएझोलिन–3–वन	5.50
8	जलीय पायस में 30% पॉलीडाइमेथिलसाइलोक्सेन्स	4.40
9	हेटेरोपॉलीसैकेराइड (जैनथम गम)	3.00
10	सल्फ्यूरिक एसिड, पानी में 50% विलयन	0.50
11	पानी	क्यू.एस.
	कुल	**1000.00**

घनत्व : 1.12 ग्रा./सेमी³

फसल	रोग का सामान्य नाम	बीज की प्रति कि.ग्रा. मात्रा			बीज उपचार और फसल कटाई के बीज की अवधि (दिनों में)
		स.त. (ग्रा.)	मिश्रण (मिली)	घोल बनाने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा (मिली)	
गेहूँ	अनावृत कंडवा	०.१२	१.०	एक समान रूप से बीजों पर परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त	उपलब्ध नहीं (सीड ड्रेसर)

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : उपर दिये गये निर्देशानुसार बीजोपचार इस्तेमाल करने पर ८० ग्रा./लीटर ट्रिटिकोनेझोल और ४० ग्रा./लीटर पाइरेक्लोस्ट्रोबिन गेहूँ की फसल में अनावृत कंडवा रोग के रोकथाम हेतु एक बहुत ही असरदार फफूँदनाशक है।

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : ट्रिटिकोनेझोल 80 ग्रा./लीटर + पाइरेक्लोस्ट्रोबिन 40 ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस फफूँदनाशक है। इसका फसल बुआई से पहले बीजोपचार के लिए इस्तेमाल करें।

मौसम दशाएं : मौसम का इस्तेमाल पर प्रभाव नहीं पडता हैं।

मृदा : बीजोपचार बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखें।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : बीजों की छोटी राशि के लिये ट्रिटिकोनेझोल 80 ग्रा./लीटर + पाइरेक्लोस्ट्रोबिन 40 ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस (इंश्योर परफॉर्म 120 ग्रा./ली डब्ल्यू/वी एफएस) की आवश्यक मात्रा और पानी की आवश्यक मात्रा एक समान रूप से बीजों पर परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त का घोल बनाए इस घोल को बीजों में मिलाएं और कंटैनर (ड्रम/प्लास्टिक बॅग) को हिलाए (आमतौर पर एक मिनिट से कम समय तक) जिससे सारे बीज इस मिश्रण से एकसमान रुप में ढक जाये। बीज ड्रेसिंग का काम निरंतर करने वाले व्यवसायिक उपकरणों में ट्रिटिकोनेझोल 80 ग्रा./लीटर + पाइरेक्लोस्ट्रोबिन 40 ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस (इंश्योर परफॉर्म 120 ग्रा./ली डब्ल्यू/वी एफएस) को स्लरी के रुप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

मात्रा : 1 मिलीलीटर सूत्रण प्रति किलोग्राम बीज के लिए

मिश्रण के लिए अनुदेश : बीजों की छोटी राशि के लिये ट्रिटिकोनेझोल 80 ग्रा./लीटर + पाइरेक्लोस्ट्रोबिन 40 ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस (इंश्योर परफॉर्म 120 ग्रा./ली डब्ल्यू/वी एफएस) की आवश्यक मात्रा और पानी की आवश्यक मात्रा एक समान रूप से बीजों पर परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त का घोल बनाए इस घोल को बीजों में मिलाएं और कंटैनर (ड्रम/प्लास्टिक बॅग) को हिलाए (आमतौर पर एक मिनिट से कम समय तक) जिससे सारे बीज इस मिश्रण से एकसमान रुप में ढक जाये।

पुन: प्रवेश की अवधि : लागू नहीं।

फसल की कटाई पूर्व का अंतराल : लागू नहीं।

उपयोग का समय निर्धारण : यह बुआई से पहले बीजोपचार के लिये प्रयोग किया जाता है।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या : बीजोपचार केवल एकबार बुआई से पहले प्रयोग करे।

प्रस्थिति जिसके दौरान फफूँदनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगें : यह एक बीज उपचार उत्पाद है और पत्ते पर इस्तेमाल नहीं करें ।

भंडारण : 1. फफूँदीनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और फफूँदीनाशक के स्वरूप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए। 2. फफूँदीनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

सुरक्षा सावधानियां : 1. घोल बनाते समय उसके छलके या छिटकने से त्वचा पर लगने या सांस द्वारा अंदर जाने से रोकें, खाली हाथ से घोल न बनाएं। 2. इस्तेमालकर्ता को पूर्णत: सुरक्षाकारी वस्त्र पहनने चाहिए, जिसमें रबर के दस्ताने, बूट, चेहरे का नकाब और रबर का पूरा एप्रन तथा हैट शामिल है।

विषबाधा के लक्षण : कोई विशेष लक्षण नहीं है। त्वचा में जलन हो सकती है।

प्राथमिक उपचार : शरीर के भीतर जाने पर तुरंत मुँह धोएँ और फिर 200–300 मि.ली. पानी पीएँ। तुरंत चिकित्सा सहायता लें। संदूषित कपड़ों को तुरंत निकाल दें। अगर साँस द्वारा भीतर चला जाए, तो रोगी को शांत रखें, उसे ताज़ा हवा में ले जाएँ, चिकित्सा सहायता लें। त्वचा के संपर्क में आने पर, संदूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएँ। आँखों के संपर्क में आने पर प्रभावित आँख को कम से कम 15 मिनट तक पलकों को खुला रखते हुए बहते पानी में धोएँ।

चिकित्सक को सलाह : विषबाधा होने पर मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें।

विष निवारण : कोई विशेष औषधोपचार नहीं है।

चेतावनी: खाली डिब्बों का पुन: उपयोग के लिए खतरनाक

कंटेनरों / उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान :

1. यह निर्माताओं, कीटनाशकों और संचालकों का कर्तव्य होगा कि वे सरप्लस सामग्री और धुलाई के पैकेजों का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण को रोका जा सके। 2. उपयोग किए गए पैकेट बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो। 3. पैकेटों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

सावधानी: 1. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है । इसलिए इसका उपयोग जलाशयों मछली उत्पादन क्षेत्र के पास नही करना चाहीए। 2. किसानों को सलाह दि जाती है कि वे अपने रोग प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रतिरोधी विकास से बचने के लिए दो फफूँदनाशक वर्गो के विभिन्न सदस्यों केबार बार उपयोग से बचें। 3. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।. 4. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आधान को नष्टकरें।

निर्माता का नाम : बीएएसएफ ऐग्री प्रोडक्शन एस. ए. एस.जोन इंडस्ट्रिएले ल्योन नॉर्ड रुए जेकार्ड, 69727, गिने सिडेक्स, फ्रांस

आयातकर्ता, पुन:पैकिंगकर्ता तथा विपणनकर्ता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 37, चांदीवली फार्म रोड, चांदीवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072, भारत **फैक्टरी :** यूनिट नं. 4, गांव निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब–140 201

Hindi

ટ્રાયટિકોનેઝોલ 80 ગ્રા / લિ. + પાયરેક્લોસ્ટ્રોબિન 40 ગ્રા / લિ. (ડબ્લ્યુ /વી) એફએસ

ઈન્શ્યોર™ પરફોર્મ

બીજોપચાર માટે ફૂગનાશક
ઉપયોગ પૂર્વે પત્રક વાંચો
કૃષિ ઉપયોગ માટે

ઈન્શ્યોર પરફોર્મ 120 ગ્રા/લિ. ડબ્લ્યુ/વી એફએસમાં સક્રિય સામગ્રીઓ તરીકે ટ્રાયટિકોનેઝોલ 80 ગ્રા/લિ. અને પાયરેક્લોસ્ટ્રોબિન 40 ગ્રા/લિ. સમાવિષ્ટ છે. ઘઉંમાં લૂઝ સ્મટ રોગ માટે બીજોપચાર તરીકે ઉપયોગ કરાતું આ અત્યંત અસરકારક ફૂગનાશક છે.

રાસાયણિક સંમિશ્રણઃ

અનિક્રમ	સામગ્રીઓ	માત્રા ડબ્લ્યુ /વી (ગ્રા / લિ.)
1	ટ્રાયટિકોનેઝોલ એ.આઈ.	80.00
2	પાયરેક્લોસ્ટ્રોબિન એ.આઈ.	40.00
3	તૈયારી કેલ્શિયમ 4– ((5– ક્લોરો– 4 મિથાઈલ– 2 સલ્ફોનેટોફિનાઈલ) એઝો)– 3– હાઈડ્રોક્સી– 2– નેપ્થોટ	120.00
4	પ્રોપેન– 1, 2, 3 ટ્રાયોલ, પાણીમાં (ગ્લીસેરોલ)	100.00
5	પોલીએરિલફિનાઈલ ઈથર સલ્ફેટ એક્રિલિક ગ્રાફ્ટ	47.00
6	કોપોલીમરનું એમોનિયમ સોલ્ટ અને પ્રોપાયલીન ગ્લાયકોલ	27.00
7	1, 2– બેન્ઝિસોથિયેઝોલિન– 3– વન પ્લસ 2– મિથાઈલ– 4– આઈઝોથિયાઝોલિન– 3– વન એક્વિયસ સંમિશ્રણમાં	5.50
8	પોલીડિમિથાઈલસિલોક્સેન્સ 30%, એક્વિયસ ઈમલ્ઝનમાં	4.40
9	હિટેરોપોલીસેકેરાઈડ (ઝેન્થમ ગમ)	3.00
10	સલ્ફ્યુરિક એસિડ, પાણીમાં 50% સંમિશ્રણ	0.50
11	પાણી	પૂરતી માત્રા
	કુલ	**1000.00**

ઘનતાઃ 1.12 ગ્રા /સેમી³

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	એક કિલો બીજ દીઠ માત્રા			બીજોપચાર અને લણણી વચ્ચે થોભવાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)
		એ.આઈ. (ગ્રા)	રચના (મિલિ)	મિશ્રણ બનાવવા માટે પાણીની આવશ્યક માત્રા (મિલિ)	
ઘઉં	લૂઝ સ્મટ	0.12	1.0	બીજને એકસમાન આવરી લેવા પૂરતું	લાગુ નહીં (સીડ ડ્રેસર)

ઉપયોગ, સંગ્રહ અને ઉપયોગ કરાનાર અંગત રક્ષણ ઉપકરણો માટે નિર્દેશ

ઉપયોગ માટે નિર્દેશઃ નાના લોટ્સ માટે ટ્રાયટિકોનેઝોલ 80 ગ્રા/લિ. + પાયરેક્લોસ્ટ્રબિન 40 ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/વી) એફએસ (ઈન્શ્યોર પરફોર્મ 120 ગ્રા/લિ. એફએસ) પ્રોડક્ટની આવશ્યક માત્રાને, બીજને એકસમાન આવરી લેવા માટે પૂરતા પાણી સાથે મિશ્રણ કરો. મિશ્રણ બીજમાં ઉમેરો અને બીજ એકસમાન આવરી નહીં લેવાય ત્યાં સુધી કન્ટેઈનર (ડ્રમ/પ્લાસ્ટિકની થેલી) સતત ફેરવતા અથવા હલાવતા રહો (સામાન્ય રીતે એક મિનિટથી ઓછો સમય). ટ્રાયટિકોનેઝોલ 80 ગ્રા/લિ. + પાયરેક્લોસ્ટ્રબિન 40 ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/વી) એફએસ (ઈન્શ્યોર પરફોર્મ 120 ગ્રા/લિ. એફએસ) એકધારી રીતે ઓપરેટિંગ કમર્શિયલ સીડ ડ્રેસિંગ ઉપકરણ સાથે છંટકાવ માટે મિશ્રણ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

છંટકાવનો સમય અને પાકનો તબક્કોઃ બીજ/કંદની વાવણી/રોપણી પૂર્વે બીજ અને માટીજન્ય રોગો માટે પ્રતિબંધાત્મક છંટકાવ.

હવામાનની સ્થિતિઓઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

માટીઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

છંટકાવની ટેકનિક, ઉપકરણનો પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકારઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

માત્રાઃ ઘઉં (એક કિલો બીજ દીઠ 1 મિલિ)

મિશ્રણ માટે સૂચનાઃ ઉપચાર કરવાનાં બીજને એકસમાન આવરી લેવા માટે પૂરતું.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળોઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

પીએચઆઈઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

છંટકાવનો સમયઃ બીજની વાવણી/રોપણી પૂર્વે.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતાઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

કોઈ પણ પાક પર છંટકાવ નહીં કરી શકાય તેવા તબક્કાઃ લાગુ નથી, કારણ કે પ્રોડક્ટ બીજોપચાર માટે જ ઉપયોગ કરવાની છે.

સંગ્રહઃ 1. ફૂગનાશકનો સમાવેશ ધરાવતાં પેકેજો અન્ય સામગ્રીનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગ કરાતા રૂમ અથવા સંકુલોથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં સંગ્રહ કરવો જોઈએ અથવા અલગ કબાટમાં તાળું મારીને રાખવા જોઈએ. 2. ફૂગનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ અથવા સંકુલો મજબૂત બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાશવાળા અને પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ, જેથી પાણી અને બાષ્પથી દૂષિત નહીં થાય.

સાવચેતીઓઃ 1. ઢોળાય અથવા ધૂમ્ર ઊડે ત્યારે શ્વાસમાં નહીં જવું જોઈએ અને ત્વચા સાથે સંપર્કથી બચો. ખુલ્લા હાથથી મિશ્રણ નહીં કરવું. 2. ઉપભોક્તાએ સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવાં, જેમાં રબરનાં હાથમોજાં, બૂટ, ચહેરા પર કવચ અને એકંદર અથવા રબર એપ્રોન અથવા હેટનો સમાવેશ થાય છે.

કન્ટેઈનરોનો નિકાલઃ 1. પેકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનો અને કન્ટેઈનરોના ધોવાણનો કચરો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ, જેથી પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય. 2. ફરીથી ઉપયોગ ટાળવા માટે ઉપયોગ કરેલાં પેકેજીસ બહાર ખુલ્લામાં છોડી નહીં દેવા જોઈએ. 3. પેકેજીસ તોડીને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.

ઝેરનાં લક્ષણોઃ એલર્જિક પ્રતિક્રિયા ઉદભવી શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ જો પેટમાં જાય તો મોઢું તુરંત પાણીમાં બોળો અને ત્યાર પછી 200– 300 મિલિ પાણી પીઓ. તુરંત તબીબને બતાવો. દૂષિત કપડાં તુરંત કાઢી નાખો. જો શ્વાસમાં જાય તો દર્દીને શાંત રહેવા કહો, તેને ખુલ્લી હવામાં લાવો, તબીબને બતાવો. ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર દૂષિત ત્વચા સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો આંખોની પાંપણો ખુલ્લી રાખીને વહેતા પાણીમાં કમસેકમ 15 મિનિટ સુધી અસરગ્રસ્ત આંખોને ધુઓ.

વિષનાશકઃ કોઈ ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. લક્ષણો પ્રમાણે દર્દીનો ઉપચાર કરો (વિશુદ્ધિકરણ, મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી).

સાવચેતીનું નિવેદનઃ 1. ઉત્પાદન માછલી માટે ઝેરી છે અને તેથી મોલેક્યુલ્સનો સમાવેશ ધરાવતું આ ઉત્પાદન મત્સ્યપાલન કરાતું હોય ત્યાં ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. 2. ખેડૂતોને તેમના રોગ માવજત કાર્યક્રમમાં પ્રતિરોધકતાનો વિકાસ ટાળવા માટે બે ફૂગનાશકના વર્ગોના અલગ અલગ સભ્યોનો વારંવાર ઉપયોગ કરવાનું ટાળવાની સલાહ છે. 3. આ લેબલ/પત્રક પર ઉલેખ સિવાયના પાક પર અજમાવશો નહીં. 3. ઉપયોગ પછી પત્રક પર નિર્દેશ અનુસાર કન્ટેઈનરનો નાશ કરો.

ઉત્પાદકઃ બીએએસએફ એગ્રી– પ્રોડક્શન એસ.એ.એસ., ઝોન ઈન્ડસ્ટ્રિયલ લાયોન નોર્ડ, રયુ જેકર્ડ, 69727, જીને સેડેક્સ, ફ્રાન્સ. **આયાતકર્તા, પુનઃપેક કરનાર અને વિક્રેતાઃ બીએએસએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, નોંધણીકૃત કાર્યાલયઃ** બીએએસએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ, પ્લોટ નં. 37, ચાંદિવલી ફાર્મ રોડ, ચાંદિવલી, અંધેરી (પૂ), મુંબઈ– 400 072, ભારત. **ફેક્ટરીઃ** યુનિટ નં. 4, ગામ નિંબુઆ, પી.ઓ. મુબારકપુર– 140 201, તાલુકો ડેરા બસ્સી, જિલ્લો– મોહાલી, પંજાબ.

Gujarati

ट्रिटीकोनाझोल ८० ग्रॅ/लि + पायराक्लोस्ट्रोबिन ४० ग्रॅ/लि (भा/आ) एफएस

इन्शुअर™ परफॉर्म

बियाणे प्रक्रियेसाठी बुरशीनाशक
वापरण्यापूर्वी पत्रक वाचा
कृषी वापरासाठी

इन्शुअर परफॉर्म १२० ग्रॅ/लि. भा/आ एफएस मध्ये सक्रीय घटक म्हणून ८० ग्रॅ/लि ट्रिटीकोनाझोल आणि ४० ग्रॅ/लि पायराक्लोस्ट्रोबिन आहे. गव्हावरील काळा तांबेरा ह्या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बियाणे प्रक्रिया म्हणून वापरण्यात येणारे हे अत्यंत प्रभावी बुरशीनाशक आहे

रासायनिक संरचना:

अनु.क्र.	घटक	प्रमाण भा/आ (ग्रॅ/लि)
१	ट्रिटीकोनाझोल स.घ.	८०.००
२	पायराक्लोस्ट्रोबिन स.घ.	४०.००
३	कॅल्शियम ४–[(५–क्लोरो–४–मिथाईल–२–सल्फोनॅटोफिनाईल) अॅझो]–३–हायड्रोक्सि–२–नॅफ्थोएट चे रसायन	१२०.००
४	प्रोपेन–१,२,३ ट्रायॉल, (ग्लिसरॉल)	१००.००
५	पॉलिराइलफिनाईल ईथर सल्फेटचे अमोनियम सॉल्ट	४७.००
६	पाण्यामधील अॅक्रायलिक ग्राफ्ट कोपोलायमर आणि प्रॉपिलिन ग्लायकॉल	२७.००
७	१,२–बेन्झिसोथिअॅझोलीन–३–वन प्लस २–मिथाईल–४–आयसोथिअॅझोलीन–३–वन जलमय द्रावणामध्ये	५.५०
८	पॉलिडायमिथाइलसायक्लोक्सेनेस ३०% जलमय द्रावणात	४.४०
९	हेटेरोपॉलिसॅचराइड (झॅन्थमगम)	३.००
१०	पाण्यामध्ये ५०% द्रावणात सल्फ्युरिक अॅसिड	०.५०
११	पाणी	उर्वरित भाग
	एकूण	**१००.००**

घनता: १.१२ ग्रॅ/सेमी.³

पिक	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा प्रति किग्रॅ बियाण्यासाठी			बियाणे प्रक्रियेपासून पीक तयार होइपर्यंत प्रतिक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		स.घ. (ग्रॅ.)	द्रावण (मिलि)	द्रावण तयार करण्यासाठी आवश्यक मात्रा (मिलि)	
गहू	काळा तांबेरा	०.१२	१.०	बियाण्याला सारख्या प्रमाणात आवरण करण्याइतके	लागू नाही (सीड ड्रेसर)

वापर, साठवण आणि वापरावयाची व्यक्तिगत सुरक्षा साधने यांच्यासाठी निर्देश

वापरासाठी सूचना: लहान गठ्ठ्यांसाठी बियाण्याला एकसारखे आवरण होण्यासाठी पुरेल एवढ्या पाण्यामध्ये ट्रिटीकोनाझोल ८० ग्रॅ/लि + पायराक्लोस्ट्रोबिन ४० ग्रॅ/लि (भा/आ) एफएस (इन्शुअर परफॉर्म १२० ग्रॅ/लि एफएस) उत्पादनाची आवश्यक ती मात्रा मिसळा. हे प्रवाही द्रावण बियाण्यात घाला आणि त्याचे भांडे (ड्रम/प्लॅस्टिकची पिशवी) बियाण्याला एकसारखे आच्छादन होईल इतक्या वेळेपर्यंत (सामान्यत: मिनिटापेक्षा कमी वेळ) गोल फिरवा किंवा ढवळा. ट्रिटीकोनाझोल ८० ग्रॅ/लि +पायराक्लोस्ट्रोबिन ४० ग्रॅ/लि (भा/आ) एफएस (इन्शुअर परफॉर्म १२० ग्रॅ/लि एफएस) याचा वापर सतत सुरु असणाऱ्या व्यावसायिक बियाणे आच्छादन उपकरणामध्ये प्रवाही द्रावण म्हणून देखील उपयोग करता येऊ शकतो.

वापराची वेळ आणि पिकाचा टप्पा: बियाणे/कंद यांची पेरणी/लागवड करण्यापूर्वी बियाणे व मातीतून निर्माण होणाऱ्या रोगांवर प्रतिबंधात्मक वापर.

हवामानाची स्थिती: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

जमीन: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

वापराचे तंत्र, उपकरणाचा प्रकार, नोझलचा प्रकार: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

मात्रा: गहू (१ मिली/१ किग्रॅ. बियाणे).

मिश्रणासाठी सूचना: प्रक्रिया करावयाच्या बियाण्यावर एकसारखी बियाण्यावरील आच्छादन होण्यासाठी पुरेशी.

पुनर्वापर कालावधी: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

पीएचआय: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

वापराची वेळ: बियाण्याची पेरणी/लावणी करण्यापूर्वी.

फवारण्यांच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

कोणत्याही पिकावर उत्पानाचा वापर करण्यात येऊ नये असे टप्पे: हे उत्पादन फक्त बियाणे प्रक्रियेसाठी वापरण्यात यावयाचे असल्यामुळे लागू नाही.

साठवण: १. बुरशीनाशक असणारे डबे हे इतर पदार्थ, विशेषत: खाद्यपदार्थ साठविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा यांच्यापासून दूर, वेगळ्या खोल्या किंवा जागा यांच्यामध्ये साठविण्यात यावेत किंवा बुरशीनाशकाची मात्रा व स्वरुप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कडीकुलुपात बंद करुन ठेवण्यात यावेत. २. बुरशीनाशक साठविण्याच्या खोल्या किंवा जागा उत्तम बांधकाम केलेल्या, हवेशीर, भरपूर प्रकाश असलेल्या आणि वाफांमुळे होणारी विषबाधा टाळण्यासाठी हवा खेळती असणाऱ्या व पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

खबरदारी: १. श्वासात जाऊ देऊ नका आणि रसायन सौम्य करताना सांडणे किंवा शिंतोडे उडणे यामुळे त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका. उघड्या हाताने मिश्रण तयार करु नका. २. वापर करणाऱ्याने संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे वापरावेत, ज्यामध्ये रबरी मोजे, बूट, फेसशिल्ड आणि ओव्हरऑल किंवा रबरी अॅप्रॉन किंवा हॅट यांचा समावेश असेल.

डब्यांची विल्हेवाट: १. डबे किंवा अतिरिक्त सामुग्री आणि यंत्रे व डबे यांची धुवण यांची पर्यावरण आणि पाणी यांचे प्रदूषण होणार नाही, अशा सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. २. पुनर्वापर टाळण्यासाठी वापरलेले डबे बाहेर उघड्यावर टाकू नयेत. ३. डबे तोडून टाकावेत आणि लोकवस्ती पासून दूर ठिकाणी जमिनीत गाडून टाकण्यात यावेत.

विषबाधेची लक्षणे: अॅलर्जीकारक प्रतिक्रिया निर्माण होऊ शकतात.

प्रथमोपचार: गिळले गेले असल्यास तोंड ताबडतोब धुवून टाका आणि त्यानंतर २००–३०० मिली पाणी प्या. तात्काळ वैद्यकीय सहाय्य मिळवा. दूषित कपडे ताबडतोब काढून टाका. श्वासात गेले असल्यास रुग्णाला शांत ठेवा, मोकळ्या हवेत हलवा, वैद्यकीय मदत मिळवा. त्वचेशी संपर्क झाला असल्यास दूषित त्वचा साबण आणि पाण्याच्या साह्याने व्यवस्थित धुवून काढा. डोळ्यांशी संपर्क आला असल्यास, पापण्या उघड्या ठेवून वाहत्या पाण्याखाली, कमीत कमी १५ मिनिटे दूषित डोळे धुवून काढा.

उतारा: विशिष्ट उतारा माहित नाही. रुग्णावर (डिकन्टेमिनेशन, वायटल फंक्शन इ.) लक्षणांनुसार उपचार करा.

सावधगिरीबाबत निवेदन: १. उत्पादन माशांसाठी विषकारक आहे आणि त्यामुळे उत्पादन असणाऱ्या पदार्थांचा वापर मत्स्यशेतीजवळ करण्याचे टाळा. २. रोग व्यवस्थापन कार्यक्रमामध्ये प्रतिकारात्मक क्रिया निर्माण होण्याचे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बुरशीनाशकांच्या दोन वेगळ्या गटांतील वेगवेगळ्या घटकांचा वापर वारंवार करण्याचे टाळावे. ३. हे लेबल/पत्रक यामध्ये नमूद केल्या व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरु नये. ४. वापर केल्यानंतर पत्रकामध्ये निर्देश दिल्यानुसार डबे नष्ट करा.

निर्माते: बीएएसएफ अॅग्री–प्रॉडक्शन एस.ए.एस, झोन इंडस्ट्रियल लियॉन नॉर्ड, रु जॅक्वॉर्ड ६९७२७, जीने सेडेक्स, फ्रान्स. **आयातकर्ता, रिपॅकिंग आणि विपणनकर्ता: बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, नोंदणीकृत कार्यालय:** बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. ३७, चांदिवली फार्म रोड, चांदिवली, अंधेरी (पू.), मुंबई–४०००७२, भारत. **फॅक्टरी:** युनिट नं. ४ , गाव: निम्बुआ, पो.ऑ.: मुबारकपूर – १४०२०१, तहसील डेराबस्सी, जिल्हा: मोहाली, पंजाब.

Marathi

ਟ੍ਰਾਈਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੮੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੪੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਡਬਲਯੂ/ਵੀ) ਐਫ਼ਐਸ

ਇਨਸ਼ੋਅਰ™ ਪਰਫ਼ਾਰਮ

ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ
ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ

ਇਨਸ਼ੋਅਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮ ੧੨੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਡਬਲਯੂ/ਵੀ ਐਫ਼ਐਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਰਿਆ ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ੮੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਟ੍ਰਾਈਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਅਤੇ ੪੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਸਮੱਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਕ੍ਰ.	ਤੱਤ	ਅੰਸ਼ ਡਬਲਯੂ/ਵੀ. (ਗ੍ਰਾ.ਲੀ.)
੧	ਟ੍ਰਾਈਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਕਿ.ਤ.	੮੦.੦੦
੨	ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਕਿ.ਤ.	੪੦.੦੦
੩	ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ੪–[(੫–ਕਲੋਰੋ–੪–ਮੇਥਾਈਲ–੨–ਸਲਫ਼ੋਨਾਟੋਫ਼ੇਨਾਈਲ) ਐਜ਼ੋ]–੩–ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ–੨–ਨਾਫ਼ਥੋਏਟ	੧੨੦.੦੦
੪	ਪ੍ਰੋਪੇਨ–੧,੨,੩ ਟ੍ਰਾਈਓਲ, (ਗਲਾਈਸਰੋਲ)	੧੦੦.੦੦
੫	ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ਼ ਪੋਲੀਅਰਾਈਲਫ਼ੇਨਾਈਲ ਈਥਰ ਸਲਫ਼ੇਟ	੪੭.੦੦
੬	ਐਕਰੀਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕੋਪੋਲਾਈਮਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	੨੭.੦੦
੭	੧, ੨–ਬੈਂਜ਼ੀਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲੀਨ–੩–ਵਨ ਪਲੱਸ ੨–ਮੇਥਾਈਲ –੪–ਆਈਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲੀਨ–੩–ਵਨ ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ	੫.੫੦
੮	ਪੋਲੀਡਾਈਮੇਥਾਈਲਸੀਲੋਕਸੇਨ ੩੦% ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ	੪.੪੦
੯	ਹੇਟਰੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ (ਸਾਨਥਮ ਗੂੰਮ)	੩.੦੦
੧੦	ਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਏਸਿਡ, ੫੦% ਘੋਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ੦.੫੦	
੧੧	ਪਾਣੀ	ਕਿਊ.ਐਸ.
	ਕੁੱਲ	**੧੦੦੦.੦੦**

ਡੈਂਸਿਟੀ: ੧.੧੨ ਗ੍ਰਾ./ਸੀਮੀ³

ਫ਼ਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ ਮਾਤਰਾ			ਬੀਜ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ (ਮਿਲੀ.)	ਲੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ (ਮਿਲੀ.)	
ਕਣਕ	ਲੂਜ਼ ਸਮੱਟ	੦.੧੨	੧.੦	ਬੀਜ ਇਕਸਾਰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ (ਬੀਜ ਡ੍ਰੈਸਰ)

ਵਰਤਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਈਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੮੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੪੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਡਬਲਯੂ/ਵੀ) ਐਫ਼ਐਸ (ਇਨਸ਼ੋਅਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮ ੧੨੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਐਫ਼ਐਸ) ਨੂੰ ਏਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਟੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੀਜ ਇਕਸਾਰ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ (ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਮ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ) ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਘੁਮਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਇਕਸਾਰ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ)। ਟ੍ਰਾਈਟੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੮੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੪੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਡਬਲਯੂ/ਵੀ) ਐਫ਼ਐਸ (ਇਨਸ਼ੋਅਰ ਪਰਫ਼ਾਰਮ ੧੨੦ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਐਫ਼ਐਸ) ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਲੇਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਬੀਜ/ਗੰਢਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਨੋਜ਼ਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਤਰਾ: ਕਣਕ (੧ ਮਿਲੀ./ਕਿਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ)।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ।

ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਚਆਈ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ/ਰੋਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਡ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧. ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਦਵਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੌਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ੧. ਮਿਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸੁੰਘੋ, ਨਾ ਹੀ ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ੨. ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, ਓਵਰਾਲ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਟੋਪ।

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਪੈਕੇਜਾਂ, ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜਾਂ/ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਇਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਸਟਏਡ: ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂਲੀਆਂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ੨੦੦–੩੦੦ ਮਿਲੀ. ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਓ। ਦਵਾ ਸੁੰਘ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਪਲਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ)।

ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਿਆਨ: ੧. ਉਤਪਾਦਨ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਣੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵ ਪਾਲਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ੨. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ–ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ੩. ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ੪. ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਨਿਰਮਾਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਐਗਰੀ–ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ., ਜ਼ੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲ ਲੀਓਨ ਨੋਰਡ, ਰੂ ਜੈਕਵਾਰਡ, ੬੯੭੨੭, ਜੇਨੇ ਸੀਡੇਕਸ, ਫ਼ਰਾਂਸ। **ਆਯਾਤ, ਰੀ–ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ:** ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਪਲਾਟ ਨੂੰ ੩੭, ਚਾਂਦੀਵਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਰੋਡ, ਚਾਂਦੀਵਲੀ, ਅੰਧੇਰੀ (ਪੂ). ਮੁੰਬਈ–੪੦੦੦੭੨, ਭਾਰਤ। **ਫ਼ੈਕਟਰੀ:** ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪. ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ.ਓ. ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ – ੧੪੦੨੦੧, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ।

Punjabi

BASF
We create chemistry

Triticonazole 80 g/l +
Pyraclostrobin 40 g/l (w/v) FS

Insure® Perform

Fungicide for Seed Treatment

ट्रिटिकोनेझोल ८० ग्रा./लीटर +
पाइरेक्लोस्ट्रोबिन ४० ग्रा./ली. (डब्ल्यू/वी) एफएस

इंश्योर™ परफॉर्म

(बीजोपचार के लिए फफूंदनाशक)

Manufactured by: BASF Agri-Production
S.A.S., Zone Industrielle Lyon Nord, Rue
Jacquard, 69727, Genay Cedex, France.
निर्माता का नाम : बीएएसएफ ऐग्री प्रोडक्शन एस. ए.
एस.जोन इंडस्ट्रिएले ल्योन नॉर्ड रुए जेकार्ड, 69727,
गिने सिडेक्स, फ्रांस

Consumer Care Cell:
Manager Consumer Cell,
BASF India Limited,
address as above,
Tel.: (0)7415002222,
E-mail : consumeragro-india@basf.com

Imported, Re-packed & Marketed by:
BASF India Limited ,
Registered office: BASF India Limited, Plot
no.37, Chandivali Farm Road, Chandivali,
Andheri (E), Mumbai - 400072, India.
Factory: Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O
Mubarakpur - 140201,Tehsil Dera Bassi,
Distt. Mohali , Punjab.

आयातकर्ता, पुन:पैकिंगकर्ता तथा विपणनकर्ता :
बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 37, चांदीवली फार्म रोड,
चांदीवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072, भारत
फैक्टरी : यूनिट नं. 4, गांव निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर
तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब–140 201

® = Registered Trademark of BASF Group Company
® = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का रजिस्ट्रड ट्रेडमार्क
TM = Trademark of BASF Group Company
TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

Harmful

F2183
Vimson