Read Leaflet before use

Flocoumafen 0.005% Block bait

Storm® 0.005% BB

(Rodenticide)

For import only

For Pest Control Operators (P.C.O) use only

Flocoumafen 0.005% Block Bait (BB) is a potent single feed anticoagulant effective against several species of rats and mice in field and storage.

Chemical Composition:

Sr.No.	Ingredient	% w/w
1.	Flocoumafen a.i.	0.005
2.	Denatonium benzoate	0.001
3.	Erioglaucine disodium salt	0.025
4.	Anhydrous citric acid	0.5
5.	Ortho-phenylphenol	0.05
6.	Amorphous silica	0.0507
7.	Sodium chloride	0.369
8.	Alpha copper phthalocyanine	0.1
9.	Wax powder	24.98
10	Wheat flour	36.98
11.	Cut wheat	q.s.
	Total	**100.00**

Application

Usage	Common pests	Dosage				Waiting period (Days)
		a.i. (mg)	Formulation (g)	How to apply	Water (Litres)	
For rodent control in field, storage and Crops like Rice,Soybean & Cocount	*(Rattus rattus, Bandicota Bengalensis, Tatera indica and Mus musculus)*	0.75-1.0	15-20	At an interval of 5-10m in bait station or active burrow. Reapeat the application after 14 days if the problem persists.	Not Applicable	Not Applicable

Application & Recommendation for use: Use bait stations made of tins or earthen pots, bamboo, coconut or any other locally available materials when bait is not placed in active burrows. Flocoumafen 0.005% BB will kill rats and mice following a single feed. This is ready to use and should not be diluted by the addition of other foodstuffs.

Direction and Plant Protection Equipments to be used: Manual application in the infested areas. Use bait stations made of tins or earthen pots, bamboo, coconut or any other locally available materials when bait is not placed in active burrows. Flocoumafen 0.005% BB will kill rats and mice following a single feed. This is ready to use and should not be diluted by the addition of other foodstuffs.

Time of Application and crop stage: Manual application in the infested areas

Weather conditions: Not applicable because it is used as bait stations.

Soil: Not applicable because it is used as bait stations.

Application technique, equipment type, nozzle type: Manual application in the infested areas

Dosage: 15-20 gm formulation at an interval of 5-10 m in bait station or active burrow. Repeat the application after 14 days if the problem persists.

Instruction for mixing: Use bait stations made of tins or earthen pots, bamboo, coconut or any other locally available materials when bait is not placed in active burrows.

Re-entry period: Not applicable because it is used as bait stations.

PHI: Not applicable because it is used as bait stations.

Application timing: Not applicable because it is used as bait stations

Frequency including maximum number of sprays: Not applicable because it is used as bait stations.

Stages during which Rodenticide should not be applied on any crop: Not applicable because it is used as bait stations.

Phytotoxiciy: The product is not phytotoxic.

STORAGE: 1. Store the bait in its original labelled container in a safe place. The package containing the Rodenticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of rodenticide. 2. The rooms or premises meant for storing the rodenticide shall be well built, airy, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

PRECAUTIONS: 1. Rodenticide baits and dead rodents can be attractive to mammals and are therefore hazardous to domestic animals and to wild life. Product is toxic to fish and aquatic invertebrate and thus the product may not be used near aquaculture. 2. Avoid contact by mouth. Wash your hands and exposed skin with soap and tap water after work and before eating, drinking and smoking. 3. Prevent access to the bait by children, birds and domestic animals, particularly cats, dogs and poultry. 4. Do not use where food, feed or water could become contaminated. 5. Burn all rodent bodies. Do not place them in refuse bins or rubbish tips.

DISPOSAL OF CONTAINERS: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages of surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

POISONING SYMPTOMS: Bruising easily with occasional nasal or oral bleeding, blood in faeces or utine, excessive bleeding from minor cuts or abrasions, laboured breathing, pale mouth and cold gums, anorexia, general weakness, subcutaneous swelling; when around joints may result in lameness.

FIRST AID: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink, Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. Call the doctor immediately. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. Call the doctor immediately. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. Call the doctor immediately. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, Irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. Call the doctor immediately.

ANTIDOTE: Intravenous injection of Vitamin K1 (Phytomenadione) (2 to 5mg/kg body weight). Diagnosis is based on a combination of clinical signs, circumstantial evidence and laboratory tests. A reliable indication of a coumarin anticoagulant effect, particularly if clinical signs are minimal is the determination of prothrombin time. Anticoagulation with coumarins leads to an increase in prothrombin time and successful treatment will quickly return it to normal levels.

Prothrombin time testing should be carried out wherever possible, at least before the start of treatment and after antidote is withdrawn

Cautionary Statement: 1. Search for and remove moribund and dead rodents at frequent intervals during treatment reduces the likelihood of predators and scavengers consuming them. 2. Not to be used on crops other than mentioned on this label & leaflet. 3. Rodenticide baits and dead rodents can be attractive to animals and therefore hazardous to domestic animals and to wild-life. 4. Product is toxic to fish and aquatic invertebrates and thus, the product may not be used near aquaculture.

Manufactured by: BASF plc, St. Michael's Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, United Kingdom

Imported and re-packed by: BASF India Limited

Registered office: Unit No. 10A, 10B & 10C (Part), 10th Floor, Godrej one, Pirojsha Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra, India.

Factory: Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab-140201.

English

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़े

फ्लोकुमाफेन ०.००५% ब्लॉक बेट

स्टॉर्म™ ०.००५% बीबी

(कृंतकनाशी)

आयात के लिए

केवल किट नियंत्रण संचालक (पीसीओ) उपयोग के लिए

फ्लाकुमाफेन ०.००५% ब्लॉक बेट (बीबी) एक सक्षम एकल खुराक स्कंदनरोधी है, जो फसलों जैसे नारियल, धान, सोयाबीन और भंडारण में कृंतक नियंत्रण के लिए कई प्रजातियों के चूहों के विरुद्ध प्रभावी है।

रासायनिक संयोजन:

क्रमांक	सामग्री	% भार/भार
१.	फ्लोकुमाफेन (सक्रिय सामग्री)	०.००५
२.	डेनाटोनियम बेंजोएट	०.००१
३.	एरियोग्लोसिन डायसोडियम साल्ट	०.०२५
४.	एनहाइड्रस साइट्रिक एसिड	०.५
५.	ऑर्थो-फेनिलफेनोल	०.०५
६.	एमोर्फस सिलिका	०.०५०७
७.	सोडियम क्लोराइड	०.३६९
८.	अल्फा कॉपर थालोसाइएनाइन	०.१
९.	मोम का चूरा	२४.९८
१०.	गेहूँ का आटा	३६.९८
११.	कटा हुआ गेहूँ	पर्याप्त मात्रा
	कुल	**१००.००**

प्रयोग

उपयोग	सामान्य कीट	खुराक				प्रतीक्षा अवधि (दिन)
		ए.आई. (मि.ग्रा.)	सूत्रीकरण (ग्रा.)	कैसे प्रयोग करें	पानी (लीटर)	
फसलों जैसे नारियल, धान, सोयबीन और भंडारण	*रेटेट्स रेटेट्स, बॅन्डीकोटा बेंगलेंसिस, टटेरा इंडिका और मस मसक्यूलेस*	०.७५-१.०	१५-२०	चारे की जगह या सक्रिय बिल में ५-१० मीटर के अंतराल पर. अगर समस्या बनी रहे तो १४ दिनों के बाद फिर से प्रयोग करें।	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : चूहे ग्रसित क्षेत्र में हाथ से प्रयोग करें. जब बेट सक्रिय बिलों में नहीं रखा जाए, तो टिन या मिट्टी के बर्तनों, बाँस, नारियल या स्थानीय तौर पर निर्मित किसी अन्य उपलब्ध सामग्री से बने बेट स्टेशन का उपयोग करें। फ्लोकुमाफेन 0.005% बी.बी. चूहों एवं मूषकों को एक ही खुराक में मार देगा। यह उपयोग के लिए तैयार है और इसमें कोई अन्य खाने-पीने की चीज़ ना मिलायें।

निर्देश तथा इस्तेमाल किए जाने वाले पौध सुरक्षा उपकरण: प्रभावित क्षेत्रों में मैनुअल आवेदन। चूहे ग्रसित क्षेत्र में हाथ से प्रयोग करें। जब बेट सक्रिय बिलों में नहीं रखा जाए, तो टिन या मिट्टी के बर्तनों, बाँस, नारियल या स्थानीय तौर पर निर्मित किसी अन्य उपलब्ध सामग्री से बने बेट स्टेशन का उपयोग करें। फ्लोकुमाफेन 0.005% बी.बी. चूहों एवं मूषकों को एक ही खुराक में मार देगा। यह उपयोग के लिए तैयार है और इसमें कोई अन्य खाने-पीने की चीज़ ना मिलायें।

उपयोग का समय एवं फसल की अवस्था: पीड़ित क्षेत्रों में हस्तगत उपयोग।

मौसमी परिस्थितियाँ: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

मिट्टी: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

उपयोग की तकनीक, उपकरण का प्रकार, नोज़ल का प्रकार: पीड़ित क्षेत्रों में हस्तगत उपयोग।

मात्रा: बैट स्टेशन (चारा स्थल) या सक्रिय बिल में 5-10 मी. के अंतराल पर 15-20 ग्राम फॉर्मूलेशन रखें। अगर समस्या बनी रहे तो 14 दिन बाद इसका उपयोग दोहराएँ।

मिश्रण के लिए निर्देश: बैट स्टेशन के रूप में टिन के बने डिब्बे या मिट्टी, बाँस, नारियल या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य किसी सामग्री से निर्मित पात्र का उपयोग करें, जब चारे को सक्रिय बिलों के पास नहीं रखा जाए।

पुन:प्रवेश अवधि : लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

पीएचआई: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

उपयोग का समय: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

आवृत्ति, छिड़काव की अधिकतम संख्या सहित: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

वे अवस्थाएँ, जिनके दौरान कृंतकनाशी का उपयोग किसी भी फसल पर नहीं करना चाहिए: लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है।

पौधविशाक्तता: यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

भंडारण: 1. बेट को इसके असली लेबल लगे हुए कंटेनर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कृंतकनाशी युक्त पैकेज को अलग कमरों में या परिसरों में रखना चाहिए, जो उन कमरों या परिसरों से दूर हों, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और खासतौर पर खाने-पीने की वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता हो या उन्हें कृंतकनाशी की मात्रा एवं प्रकृति के आधार पर किसी अलग अलमारी में ताले में बंद करके रखना चाहिए। 2. कृंतकनाशी के भंडारण के लिए बनाए गए कमरों या परिसरों को अच्छी तरह से निर्मित, हवादार, अच्छी प्रकाश व्यवस्था वाले एवं खुले व वाष्प से होने वाले संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होना चाहिए।

सावधानियाँ: 1. स्तनधारियों के लिए कृंतक कीटनाशक और मृत कृंतक आकर्षक हो सकते हैं और इसलिए घरेलू पशुओं और जंगली जीवन के लिए खतरनाक हैं। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरूकीय के लिए विषाक्त है और इस प्रकार उत्पाद का उपयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जा सकता है। 2. मुँह से किसी भी संपर्क से बचें। काम करने के बाद एवं खाने, पीने एवं धूम्रपान करने से पहले अपने हाथों एवं संपर्क में आई त्वचा को साबुन व नल के पानी से अच्छी तरह से धोएँ। 3. बेट को बच्चों, पक्षियों एवं घरेलू जानवरों, खासतौर पर बिल्लियों, कुत्तों एवं मुर्गे-मुर्गियों की पहुँच से दूर रखें। 4. इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर न करें, जहाँ भोजन या पानी इससे दूषित हो सकता हो। 5. चूहों के शवों को जला दें। उन्हें कचरे के डिब्बों या मलबे में न डालें।

कंटेनरों/उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान: 1. यह निर्माताओं, कीटनाशकों और संचालकों का कर्तव्य होगा कि वे सरप्लस सामग्री और धुलाई के पैकेजों का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण को रोका जा सके। 2. उपयोग किए गए पैकेट बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो। 3. पैकेटों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

विष के लक्षण: रक्तस्राव की प्रवृत्ति में वृद्धि गंभीर विष का संकेत हो सकता है। कभी-कभी नाक या मुंह से खून आने के साथ नील पड़ना, मल या मूत्र में रक्त, हलके कटाव या खरोंच से अत्यधिक रक्तस्राव, अस्वाभाविक श्वसन, मुँह पर पीलापन और ठंडे मसूड़े, अरुचि, सामान्य कमजोरी, अवत्वचीय सूजन; जोड़ों के आसपास होने पर लंगड़ापन हो सकता है।

प्रथमोपचार: अगर मुँह से निगल लिया है : यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह कुल्ला कराये और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। तुंरत डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये। तुंरत डॉक्टर को बुलाएं। **यदि साँस में लिये जाने पर :** रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। तुंरत डॉक्टर को बुलाएं। **त्वचा के संपर्क के मामले में :** शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। तुंरत डॉक्टर को बुलाएं। **आंखों के संपर्क के मामले में :** कम से कम 15 मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। तुंरत डॉक्टर को बुलाएं।

विषरोधक : विटामिन के-1 (फाइटोमेनाडियोन) का अंत:नसीय इंजेक्शन (2 से 5 मि.ग्रा./कि.ग्रा. शारीरिक वजन)। निदान नैदानिक संकेतों, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रयोगशाला परीक्षणों के संयोजन पर आधारित है। एककाइमरिन एंटीकोआगुलेंट प्रभाव का एकविश्वसनीय संकेत, खासकर अगर नैदानिकसंकेत कम से कम हैं, तो प्रोथोबिन समय का निर्धारण। काइमरिन के साथ एंटीकोआगुलेशन प्रोथोम्बिन समय में वृद्धि की ओर जाता है और सफल उपचार जल्दी से सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगा। प्रोथोम्बिन समय परीक्षण जहां भी संभव हो, इलाज शुरूहोने से पहले और एंटीडोट के बाद वापस ले लिया जाना चाहिए।

सावधानी: 1. उपयोग के दौरान थोड़े-थोड़े समय में मरणासन्न एवं मृत कृंतकों को ढूँढें और हटाएँ', इससे परभक्षियों और मुर्दाखोरों द्वारा उनका उपभोग करने की संभावना कम होती है। 2. स्तनधारियों के लिए कृंतक कीटनाशक और मृत कृंतक आकर्षक हो सकते हैं और इसलिए घरेलू पशुओं और जंगली जीवन के लिए खतरनाक हैं। 3.उत्पाद मछली और जलीय अकशेरूकीय के लिए विषाक्त है और इस प्रकार उत्पाद का उपयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जा सकता है। 4. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।

निर्माता: बीएएसएफ पीएलसी, से. माइकल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, विडनेस, चेशीर, डब्ल्यूए8 8टीजे, युनाइटेड किंग्डम

आयात और पून:पैकिंगकर्ता: बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 10ए, 10बी और 10सी (पार्ट), 10वीं मंजिल, गोदरेज वन, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई - 400 079, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी: यूनिट नं. 4, गांव निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब-140 201

Hindi

ઉપયોગ પૂર્વે પત્રક વાંચો

ફ્લોકુમાઇન ૦.૦૦૫% બ્લોક બેઇટ

સ્ટોર્મ™ ૦.૦૦૫% બીબી

(ઉંદરનાશક)

ફક્ત આયાત માટે

ફક્ત પેસ્ટ કંટ્રોલ ઓપરેટરો (પી.સી.ઓ.)ના ઉપયોગ માટે

ફ્લોકુમાઇન ૦.૦૦૫% બ્લોક બેઇટ (બીબી) ખેતરો અને સંગ્રહ સ્થાનો ખાતે અનેક જાતિના ઉંદરો અને ચુચુંદરો સામે અસરકારક પોટેન્ટ સિંગલ ફીડ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ છે.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ:

અનુક્રમ	સામગ્રી	% વ/વ
૧.	ફ્લોકુમાઇન એ.આઇ.	૦.૦૦૫
૨.	ડેનાટોનિયમ બેન્ઝોટ	૦.૦૦૧
૩.	ઈરિયોગ્લોસાઈન ડિસોડિયમ સોલ્ટ	૦.૦૨૫
૪.	એન્હાઇડ્રસ સાઇટ્રિક એસિડ	૦.૫
૫.	ઓર્થો-ફિનાઈલફિનોલ	૦.૦૫
૬.	એમોરફસ સિલિકા	૦.૦૫૦૭
૭.	સોડિયમ ક્લોરાઇડ	૦.૩૬૯
૮.	આલ્ફા કોપર ફેથાલોસાઈનાઈન	૦.૧
૯.	વેક્સ પાઉડર	૨૪.૯૮
૧૦.	ઘઉંનો લોટ	૩૬.૯૮
૧૧.	કાપેલા ઘઉં	પૂરતી માત્રા
	કુલ	**૧૦૦.૦૦**

છંટકાવ

ઉપયોગ	સામાન્ય જંતુ	માત્રા				થોભવાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એ.આઇ. (મિગ્રા)	રચના (ગ્રા)	કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો	પાણી (લિટર)	
ખેતર, સંગ્રહ સ્થાનો અને ડાંગર, સોયાબીન તથા નારિયેળ જેવા પાકમાં ઉંદરોના નિયંત્રણ માટે	*(રેટ્ટસ રેટ્ટસ, બેન્ડિકોટા બેન્ગાલેન્સિસ, ટાટેરા ઈન્ડિકા અને મુસ મુસ્ક્યુલસ)*	૦.૭૫-૧.૦	૧૫-૨૦	બેઇટ મથક અથવા સક્રિય બરોમાં ૫-૧૦ મિનિટના અંતરે. જો તે છતાં સમસ્યા નહીં જાય તો ૧૪ દિવસ પછી છંટકાવ દોહરાવો.	લાગુ નહીં	લાગુ નહીં

છંટકાવ અને ઉપયોગ માટે ભલામણ: બેઇટ (છટકા) સક્રિય બરોઝમાં ગોઠવવામાં નહીં આવ્યા હોય ત્યારે ટિન અથવા માટીના પોટ, બાંબૂ, નારિયેળ અથવા કોઈ અન્ય સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીના બનેલા બેઇટ મથકોનો ઉપયોગ કરો. ફ્લોકુમાઇન ૦.૦૦૫% બીબી એક ફીડમાં ઉંદરો અને ચચુંદરોનો નાશ કરશે. આ ઉપયોગ માટે તૈયાર છે અને અન્ય ખાધપદાર્થ ઉમેરીને પાણી નહીં નાખવું જોઈએ.

ઉપયોગ કરવાના નિર્દેશ અને છોડ સુરક્ષા ઉપકરણ): ચેપી વિસ્તારોમાં મેન્યુઅલ ઉપયોગ. બેઇટ (છટકા) સક્રિય બરોઝમાં ગોઠવવામાં નહીં આવ્યા હોય ત્યારે ટિન અથવા માટીના પોટ, બાંબૂ, નારિયેળ અથવા કોઈ અન્ય સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીના બનેલા બેઇટ મથકોનો ઉપયોગ કરો. ફ્લોકુમાઇન ૦.૦૦૫% બીબી એક ફીડમાં ઉંદરો અને ચચુંદરોનો નાશ કરશે. આ ઉપયોગ માટે તૈયાર છે અને અન્ય ખાધપદાર્થ ઉમેરીને પાણી નહીં નાખવું જોઈએ.

છંટકાવનો સમય અને પાકના તબક્કા: ચેપી વિસ્તારોમાં મેન્યુઅલ ઉપયોગ.

હવામાનની સ્થિતિઓ: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

માટી: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

છંટકાવ માટે પાકના તબક્કા, ઉપકરણનો પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકાર: ચેપી વિસ્તારોમાં મેન્યુઅલ ઉપયોગ.

માત્રા: રચનાના ૧૫-૨૦ ગ્રા બેઇટ મથક અથવા સક્રિય બરોમાં ૫-૧૦ મિનિટના અંતરે. જો તે છતાં સમસ્યા નહીં જાય તો ૧૪ દિવસ પછી છંટકાવ દોહરાવો.

મિશ્રણ માટે સૂચના: બેઇટ (છટકા) સક્રિય બરોઝમાં ગોઠવવામાં નહીં આવ્યા હોય ત્યારે ટિન અથવા માટીના પોટ, બાંબૂ, નારિયેળ અથવા કોઈ અન્ય સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સામગ્રીના બનેલા બેઇટ મથકોનો ઉપયોગ કરો.

પુન:પ્રવેશ સમયગાળો: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

પીએચઆઇ: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

છંટકાવનો સમય: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતા: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

ઉંદરનાશકો કોઈ પાક પર ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ તે તબક્કા: લાગુ નહીં, કારણ કે તે બેઇટ મથકો તરીકે ઉપયોગ કરાય છે.

ઝેરીપણું: આ ઉત્પાદનમાં ઝેરીપણું નથી.

સંગ્રહ: ૧. છટકાને સુરક્ષિત સ્થળે મૂળ લેબલવાળા કન્ટેઇનરમાં જ સંગ્રહ કરો. ઉંદરનાશકો ધરાવતાં પડીકાં બીજી ચીજવસ્તુઓ ખાસકરીને ખોરાકની ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડાઓ અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડાઓ અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા ઉંદરનાશકોના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કબાટોમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. ૨. ઉંદરનાશકોનો સંગ્રહ કરવા માટેનો રૂમ અથવા સંકુલો મજબૂત બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાશવાળા અને પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ, જેથી બાષ્પથી પ્રદૂષિત નહીં થાય.

સાવચેતીઓ: ૧. ઉંદરનાશક છટકા અને મૃત ઉંદરો દુધાળા જનાવરોથી આકર્ષિત થાય છે અને તેથી ઘરેલુ જનાવરો અને હિંસ જીવન માટે જોખમી છે. ઉત્પાદન માછલી અને સમુદ્રિ જીવો માટે ઝેરી છે અને તેથી ઉત્પાદન મત્સ્યપાલન કરાતું હોય તેની નજીક ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ. ૨. મોઢાથી સ્પર્શ ટાળો. તમારા હાથ અને સન્મુખ ત્વચાને કામ પૂરું થયા પછી અને ખાવા, પીવા કે ધૂમ્રપાન કરવા પૂર્વે સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. ૩. છટકા બાળકો, પક્ષીઓ અને ઘરેલુ જનાવરો, ખાસ કરીને બિલાડી, કૂતરા અને મરઘાની પહોંચથી દૂર રાખો. ૪. ખાધ, ચારો કે પાણી દૂષિત થઈ શકે તેમ હોય ત્યાં સંગ્રહ નહીં કરો. ૫. સર્વ મૃત ઉંદરોને બાળી નાખો. તેને કચરાપેટી અથવા રબિશ ટિપ્સમાં મૂકશો હીં.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ: ૧. વધારાની સામગ્રીનાં પેકેજીસ અને મશીનો અને ધોવાણનો કચરો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય તે માટે સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાની જવાબદારી જંતુનાશકના ઉત્પાદકો, રચનાકારો અને છંટકાવ કરનારની રહેશે. ૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજીસનો ફરીથી ઉપયોગ ટાળવા માટે બહાર ખુલ્લાં છોડી નહીં દેવા જોઈએ. ૩. પેકેજીસ તોડીને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.

ઝેરનાં લક્ષણો: પ્રાસંગિક નાક અથવા મોઢામાં રક્તસ્રાવ સાથે સહજ છોલાઈ જવું, ઝાડા અથવા પેશાબમાં લોહી, સહેજ કાપો અથવા ઉઝરડામાંથી અતિ રક્તસ્રાવ, શ્વાસમાં તકલીફ, મોઢું ઝાંખું પડવું અને પેઢા ઠંડા પડવા, એનોરેક્સિયા, સામાન્ય કમજોરી, સબક્યુટેનિયસ સોજો, સાંધા આસપાસ થાય તો પંગુતામાં પરિણમી શકે.

પ્રાથમિક ઉપચાર: પેટમાં જવા પર: જો વ્યક્તિ ભાનમાં અને સતર્ક હોય તો મોઢું પાણીમાં બોળો અને ૧ અથવા ૨ ગ્લાસ ભરીને પાણી પીવા માટે આપો. જો વ્યક્તિ બેભાન હોય તો મોઢા વાટે કશું પણ નહીં આપવું. ડોક્ટરને બતાવો. ડોક્ટર સૂચના નહીં આપે ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવશો નહીં. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. **શ્વાસમાં જવા પર:** દર્દીને ખુલ્લી હવામાં બહાર લાવો અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દી શ્વાસ નહીં લેતો હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. તબીબને બતાવો. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. **ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર:** અસરગ્રસ્ત શરીરના ભાગોને વાળ અને આંગળીઓની ભીતર સહિત ભરપૂર સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો દર્દ, લાલાશ અથવા ખંજવાળ તે છતાં નહીંજાય તો ડોક્ટરને બતાવો. બધાં દૂષિત કપડાં અલગ કરવાં જોઈએ અને ફરીથી ઉપયોગ કરવા પૂર્વે સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો. **આંખ સાથે સંપર્ક થવા પર:** કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી ભરપૂર પાણીમાં નમ્ર રીતે બોળો. જો તે છતાં દર્દ, લાલાશ અથવા ઝાંખું દેખાતું હોય તો નેત્ર નિષ્ણાતને બતાવો. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો.

વિષનાશક: વિટામિન K૧ (ફાયટોમેનાડિયોની) (૨થી ૫ મિગ્રા/કિગ્રા શરીરનું વજન)નું શિરા વાટે ઈન્જેક્શન. નિદાન ચિકિત્સકીય ચિહ્નો, સાંયોગિક પુરાવા અને લેબોરેટરી પરીક્ષણોના સંયોજન પર આધારિત છે. ખાસ કરીને જો ચિકિત્સકીય ચિહ્નો લઘુતમ હોય તો કાઉમેરિન એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ અસરનો વિશ્વસનીય સંકેત પ્રોથ્રોમ્બિનનો સમય નિશ્ચિત કરી શકે. કાઉમેરિન સાથે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ પ્રોથ્રોમ્બિન સમય વધારે છે અને સફળ ઉપચાર તુરંત સામાન્ય સપાટીએ તેને લાવશે.

કમસેકમ ઉપચાર શરૂ કરવા પૂર્વે અને વિષનાશક પાછું ખેંચાય તે પછી પ્રોથ્રોમ્બિન સમયનું પરીક્ષણ શક્ય હોય ત્યાં હાથ ધરવું જોઈએ.

સાવચેતીનું નિવેદન: ૧. ઉપચાર દરમિયાન વારંવાર અંતરે મૃત ઉંમદરો અને મોરિબંડ શોધીને દૂર કરવાથી તેમને ખાતા શિકારીઓ આવવાની શક્યતા ઓછી થાય છે. ૨. આ લેબલ/પત્રકમાં ઉલ્લેખ સિવાયના પાક પર અજમાવશો નહીં. ૩. ઉંમરનાશક છટકા અને મૃત ઉંદરોથી જનાવરો આકર્ષાય છે અને તેથી ઘરેલુ જનાવરો અને હિંસ જીવન માટે જોખમી છે. ૪. ઉત્પાદન માછલી અને મત્સ્યજીવો માટે ઝેરી છે અને તેથી ઉત્પાદન મત્સ્યપાલનની નજીક ઉપયોગ નહીં કરવું જોઈએ.

ઉત્પાદક: બીએએસએફ પીએલસી, સેન્ટ માઈલ્કસ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, વિડનેસ, ચેશાયક, ડબ્લ્યુએ૮ ૮ટીજે, યુનાઈટેડ કિંગડમ

આયાત, રિપેકકરનાર અને વિક્રેતા : બીએએસએફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ:

નોંધણીકૃત કચેરી: યુનિટ નં. ૧૦એ, ૧૦બી અને ૧૦સી (પાર્ટ), ૧૦મો માળ, ગોદરેજ વન, પિરોજશા નગર, ઈસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે, વિક્રોલી (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૭૯, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ફેક્ટરી: યુનિટ નં. ૪, ગામ નિંબુઆ, પી.ઓ. મુબારકપુર, તાલુકો ડેરા બસ્સી, જિલ્લો મોહાલી, પંજાબ-૧૪૦ ૨૦૧.

Gujarati

वापर करण्यापूर्वी पत्रक वाचा

फ्लोकुमाफेन ०.००५% ब्लॉक बेट

स्टॉर्म™ ०.००५% बीबी

(उंदीरनाशक)

फक्त आयातीसाठी

फक्त पेस्ट कंट्रोल नियंत्रण ऑपरेटर्सच्या (पी.सी.ओ.) वापरासाठी

फ्लोकुमाफेन ०.००५% ब्लॉक बेट (बीबी) एक प्रभावी सिंगल फीड अँटीकोआग्युलंट आहे, ज्याचा उपयोग शेती क्षेत्रात तसेच साठवणगृहांमध्ये उंदीर व उंदरांच्या अनेक प्रजातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो.

रासायनिक संरचना:

क्रम सं.	घटक	% डब्ल्यु/डब्ल्यु
१.	फ्लोकुमाफेन सक्रीय घटक	०.००५
२.	डेनाटोनियम बेंझोएट	०.००१
३.	एरिओग्लॉसिन डायसोडियम मीठ	०.०२५
४.	अनहायड्रस सायट्रिक ॲसिड	०.५
५.	ऑर्थो-फेनाईलफेनॉल	०.०५
६.	अमॉर्फस सिलिका	०.०५०७
७.	सोडियम क्लोराइड	०.३६९
८.	अल्फा कॉपर थॅलोसायनाइन	०.१
९.	मेण पावडर	२४.९८
१०.	गव्हाचे पीठ	३६.९८
११.	कापलेले गहू	पर्याप्त मात्रा
	एकूण	**१००.००**

वापर

वापर	सामान्य कीटक	मात्रा				प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
		सक्रीय घटक (मिग्रॅ)	सुत्रीकरण (ग्रॅ)	कसा वापर करायचा	पाणी (लिटर)	
शेत, साठवणगृह आणि भात, सोयाबीन तसेच नारळ यांसारख्या पिकांमध्ये उंदीर नियंत्रणासाठी	*(रॅटस रॅटस, बँडिकोटा बंगालेन्सिस, टॅटेरा इंडिका आणि मस मस्क्युलस)*	०.७५-१.०	१५-२०	प्रत्येक ५-१० मीटर अंतरावर प्रलोभन केंद्र किंवा सक्रिय बिळामध्ये ठेवावे. समस्या कायम राहिल्यास १४ दिवसांनंतर पुन्हा एकदा वापर करावा.	लागू नाही	लागू नाही

वापर आणि शिफारस: जेव्हा सक्रिय बिळांमध्ये आमिष ठेवलेले नसते, तेव्हा टिन किंवा मातीची भांडी, बांबू, नारळ किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक उपलब्ध साहित्यापासून बनवलेले आमिष स्थानाचा वापर करा. फ्लोकुमाफेन ०.००५% बीबी एकाच वेळी खाल्ल्यानंतर उंदीर आणि मुसक्युलस मरेल. हे तयार स्वरूपात उपलब्ध असून, त्यात इतर अन्नपदार्थ घालून ते पातळ करू नये.

सूचना व वापरावयाची वनसंरक्षण साधने: सुळसुळाट असलेल्या जागेत हाताने थेट वापर करावा. जेव्हा सक्रिय बिळांमध्ये आमिष ठेवलेले नसते, तेव्हा टिन किंवा मातीची भांडी, बांबू, नारळ किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक उपलब्ध साहित्यापासून बनवलेले आमिष स्थानाचा वापर करा. फ्लोकुमाफेन ०.००५% बीबी एकाच वेळी खाल्ल्यानंतर उंदीर आणि मुसक्युलस मरेल. हे तयार स्वरूपात उपलब्ध असून, त्यात इतर अन्नपदार्थ घालून ते पातळ करू नये.

वापरण्याची वेळ आणि पिकाचा टप्पा: सुळसुळाट असलेल्या जागेत हाताने वापर.

हवामान परिस्थिती: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

माती: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

उपयोग करण्याची पद्धती, उपकरणाचा प्रकार, नोझलचा प्रकार: सुळसुळाट असलेल्या जागेत हाताने वापर.

मात्रा: १५-२० ग्रॅमचे सुत्रीकरण ५-१० मीटर अंतरावर आमिष ठेवण्याच्या ठिकाणी किंवा सक्रिय बिळामध्ये वापरावे. समस्या कायम राहिल्यास १४ दिवसांनी पुन्हा वापरावे.

मिश्रणासाठी सूचना: जेव्हा सक्रिय बिळामध्ये आमिष ठेवलेले नसते, तेव्हा टिन किंवा मातीची भांडी, बांबू, नारळ किंवा इतर कोणत्याही स्थानिक उपलब्ध साहित्यापासून बनवलेले आमिष स्थानाचा वापर करा.

पुनर्वापर कालावधी: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

पीएचआय: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

वापरण्याची वेळ: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

फवारण्यांच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

कोणत्याही पिकावर उंदीरनाशकाचा वापर करण्यात येऊ नये असे टप्पे: लागू नाही कारण ते आमिष म्हणून वापरले जाते.

वनस्पतींसाठी विषारी: हे उत्पादन वनस्पतींसाठी विषारी नाही.

साठवणूक: १. आमिष मूळ लेबल असलेल्या डब्यामध्ये सुरक्षित ठिकाणी साठवा. उंदीरनाशकाची पॅकेजीस वेगळ्या खोलीत वा जागेत ठेवा. तसेच इतर अन्नपदार्थ ठेवलेल्या जागा व खोल्या यापासून दूर किंवा उंदीरनाशकाचा दर्जा व स्वरूप यांचा विचार करून कपाटात कडीकुलपात ठेवा. २. उंदीरनाशक ठेवण्याच्या खोल्या किंवा वास्तू चांगल्या बांधलेल्या, हवेशीर, भरपूर उजेड असलेल्या आणि वायुवीजन असलेल्या व बाष्पाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

खबरदाऱ्या: १. उंदरांसाठी वापरले जाणारे आमिष व मृत उंदीर हे सस्तन प्राण्यांना आकर्षित करू शकतात, त्यामुळे ते पाळीव प्राणी व वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. हे उत्पादन माशांकरिता आणि जलीय अपृष्ठवंशी प्राण्यांसाठी विषारी आहे, त्यामुळे हे मत्स्यपालन क्षेत्राजवळ वापरू नये. २. तोंडाद्वारे संपर्क टाळा. कामानंतर आणि खाण्यापूर्वी, पिण्यापूर्वी किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी साबण व नळाच्या पाण्याने हात व संपर्कात आलेली त्वचा स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे. ३. मुलांना, पक्ष्यांना व पाळीव प्राण्यांना, विशेषत: मांजरी, कुत्रे आणि कोंबड्या यांना आमिषापासून दूर ठेवावे. ४. अन्न, चारा किंवा पाण्याचा दूषितपणा होईल अशा ठिकाणी हे वापरू नये. ५. सर्व मृत उंदीर जाळून नष्ट करावेत. त्यांना कचरा डब्यांमध्ये किंवा रद्दी टाकण्याच्या जागी टाकू नये.

कंटेनर नष्ट करणे: १. पर्यावरण आणि पाण्याला प्रदुषण होणार नाही अशा प्रकारे उरलेल्या मालाची पॅकेजेस आणि धुतलेले पाणी सुरक्षितपणे नष्ट करणे ही नेहमीचे उत्पादक, किटकनाशकाचे मिश्रण तयार करणारी व्यक्ती, आणि ऑपरेटर्स यांची जबाबदारी असेल. २. उरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये यासाठी ती बाहेर टाकू नयेत. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

विषबाधेची लक्षणे: सहज रक्तस्राव होणे, अधूनमधून नाक किंवा तोंडातून रक्त येणे, विष्ठा किंवा लघवीत रक्त आढळणे, किरकोळ जखमा किंवा खरचटण्यांमधून जास्त रक्तस्राव होणे, श्वास घेण्यास अडचण येणे, तोंड निस्तेज दिसणे व हिरड्या थंड होणे, भूक न लागणे, सर्वसाधारण अशक्तपणा, त्वचेखाली सूज येणे; ही सूज सांध्याजवळ आल्यास लंगडण्याची शक्यता असते.

प्रथमोपचार: पोटात गेल्यास: ती व्यक्ती शुद्धीवर आणि जागरूक असल्यास, पाण्याने तोंड खळबळून धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही काहीही तोंडावाटे देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा अनुपस्थित डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय काही करू नका. डॉक्टरांना त्वरित कॉल करा. **श्वासावाटे आत गेल्यास:** रूग्णाला ताज्या हवेत न्या आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. रूग्णाचा श्वास सुरू नसल्यास, किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या, फिजिशियनचा सल्ला घ्या. डॉक्टरांना त्वरित कॉल करा. **त्वचेशी संपर्क आल्यास:** केस आणि नखांच्या खालच्या भागासह शरीराचा दुषित भाग साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवा. वेदना होणे,लाल होणे, किंवा क्षोभ होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दुषित कपडे वेगळे ठेवावेत आणि पुन्हा वापरण्यापुर्वी ते साबण व पाण्याने स्वतंत्र धुवावेत. डॉक्टरांना त्वरित कॉल करा. **डोळ्याशी संपर्क आल्यास:** भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे हळूवार स्वच्छ धुवा. वेदना होणे, चुरचुरणे, लाल होणे किंवा फोटोफोबिया झाल्यास, नेत्रचिकित्सकाचा सल्ला घ्या. डॉक्टरांना त्वरित कॉल करा.

उतारा: शरीराच्या वजनाच्या प्रति किलो २ ते ५ मिग्रॅ या प्रमाणात व्हिटॅमिन K१ (फायटोमेनाडिओन) चे इंजेक्शन शिरामार्गे द्यावी. निदान हे लक्षणे, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि प्रयोगशाळेतील चाचण्या यांच्या आधारे केले जाते. कुमारीन ॲन्टिकॉग्युलंट्सचा परिणाम ओळखण्याचा एक विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे प्रोथ्रोम्बिन टाईमची चाचणी करणे. कुमारीनसह ॲन्टिकॉग्युलेशनमुळे प्रोथ्रोम्बिन टाईम वाढतो, आणि योग्य उपचार केल्यास तो लवकरच सामान्य पातळीवर परततो.

उपचार सुरू करण्यापूर्वी व उतारा बंद केल्यानंतर शक्य असल्यास प्रोथ्रोम्बिन टाईम चाचणी करावी.

सावधानतेचे विधान: १. उपचारादरम्यान वारंवार निरीक्षण करून अर्धमृत व मृत उंदीर शोधून काढणे व हटवणे आवश्यक आहे, यामुळे त्यांना खाण्याची शक्यता कमी होते. २. ह्या लेबलवर/माहितीपत्रकावर नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये. ३. उंदरांसाठीचे आमिष व मृत उंदीर हे प्राण्यांना आकर्षित करतात आणि त्यामुळे पाळीव प्राणी व वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. ४. हे उत्पादन माशांसाठी व जलचर अपृष्ठवंशी प्राण्यांसाठी विषारी आहे, त्यामुळे मत्स्यपालनाजवळ हे उत्पादन वापरू नये.

उत्पादक: बीएएसएफ plc, सेंट मायकल इंडस्ट्रियल इस्टेट, विडनेस, चेशायर, डब्ल्यूए८ ८टीजे, युनायटेड किंग्डम

निर्माता आणि विक्रेता: बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,

नोंदणीकृत कार्यालय: युनिट क्रमांक 10ए, 10बी आणि 10सी (पार्ट), 10वा मजला, गोदरेज वन, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई - 400 079, महाराष्ट्र, भारत.

फॅक्टरी: युनिट क्र. ४, निंबुआ गाव, पी.ओ. मुबारकपूर-१४०२०१. तहसिल देरा बस्सी, जिल्हा मोहाली, पंजाब.

Marathi

ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ

ਫਲੋਕੁਮਾਫੇਨ ੦.੦੦੫% ਬਲਾਕ ਬੈਟ

ਸਟੋਰਮ™ ੦.੦੦੫% ਬੀਬੀ

(ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ)

ਸਿਰਫ ਅਯਾਤ ਲਈ

ਸਿਰਫ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਓ.) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਹੀ

ਫਲੋਕੁਮਾਫੇਨ ੦.੦੦੫% ਬਲਾਕ ਬੈਟ (ਬੀਬੀ) ਖੇਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਕਲ ਖੁਰਾਕ ਐਂਟੀਕੋਆਗੁਲੈਂਟ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ:

ਲ. ਸੰ.	ਸਮੱਗਰੀ	% ਵਜਨ/ਵਜਨ
੧.	ਫਲੋਕੁਮਾਫੇਨ ਏ.ਆਈ.	੦.੦੦੫
੨.	ਡੇਨਾਟੋਨਿਅਮ ਬੇਂਜ਼ੋਏਟ	੦.੦੦੧
੩.	ਏਰਿਓਗਲੂਸਾਈਨ ਡਿਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	੦.੦੨੫
੪.	ਐਨਹਾਈਡ੍ਰੌਸ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ	੦.੫
੫.	ਓਰਥੋ-ਫੇਨਾਈਲਫੇਨੋਲ	੦.੦੫
੬.	ਅਮੋਰਫੁਸ ਸਿਲਿਕਾ	੦.੦੫੦੭
੭.	ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ	੦.੩੬੯
੮.	ਅਲਫਾ ਕੋਪਰ ਫਥਾਲੋਸਯਾਨਾਈਨ	੦.੧
੯.	ਵੈਕਸ ਪਾਊਡਰ	੨੪.੯੮
੧੦.	ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ	੩੬.੯੮
੧੧.	ਕੱਟੀ ਕਣਕ	ਕਯਾਊ.ਐਸ
	ਕੁੱਲ	**੧੦੦.੦੦**

ਲਾਗੂਕਰਨ

ਉਪਯੋਗ	ਆਮ ਕੀਟ	ਖੁਰਾਕ				ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨ)
		ਏ.ਆਈ. (ਮਿਗ੍ਰਾ)	ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਗ੍ਰਾ)	ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ	ਪਾਣੀ (ਲੀਟਰ)	
ਖੇਤ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸੋਯਾਬੀਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ	*(ਰੈਟਸ ਰੈਟਸ, ਬੈਂਡਿਕੋਟਾ ਬੇਂਗਾਲੇਂਸਿਸ, ਟਟੇਰਾ ਇੰਡਿਕਾ ਅਤੇ ਮਸ ਮਸਕੁਲਸ)*	੦.੭੫-੧.੦	੧੫-੨੦	ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ੫-੧੦ ਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ। ੧੪ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਓ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼: ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟਿਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਫਲੋਕੁਮਾਫੇਨ ੦.੦੦੫% ਬੀਬੀ ਏਕਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ: ਸੰਕ੍ਰਿਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟਿਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਫਲੋਕੁਮਾਫੇਨ ੦.੦੦੫% ਬੀਬੀ ਏਕਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਪੜਾਅ: ਸੰਕ੍ਰਿਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਸੰਕ੍ਰਿਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ।

ਖੁਰਾਕ: ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ੫-੧੦ ਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ੧੫-੨੦ ਗ੍ਰਾ ਸੂਤਰੀਕਰਨ। ੧੪ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਓ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਜਦੋਂ ਬੈਟ ਸਕ੍ਰਿਅ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਟਿਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਚਆਈ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਆਵਿਰਤੀ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਾਈਟੋਟੋਕਸੀਸਿਟੀ: ਉਤਪਾਦ ਫਾਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ: ੧. ਬੈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ, ਹਵਾਦਾਰ, ਵਧੀਆ ਰੌਸ਼ਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ ਬੈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਰੇ ਚੂਹੇ ਦੁੱਧੀਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜਲਮਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ੨. ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ੩. ਬੱਚਿਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ੪. ਉੱਥੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ, ਆਹਾਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ੫. ਸਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਬੇਕਾਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੂਤਰੀਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੨. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੩. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝਰੀਟ ਪੈਣਾ, ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਮਸੂੜੇ, ਐਨੋਰੇਕਸੀਆ, ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼; ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਗੜੇਪਣ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੂਲੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ੧ ਜਾਂ ੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। **ਜੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। **ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾੜ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। **ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਸਾੜ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਾਟ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ੧ (ਫਾਈਟੋਮੇਨਾਡਿਓਨ) (੨ ਤੋਂ ੫ ਮਿਗ੍ਰਾ/ਕਿਗ੍ਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ) ਦਾ ਅੰਤਰ-ਨਸੀ ਟੀਕਾ। ਨਿਦਾਨ ਨੈਦਾਨਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੋਊਮਾਰਿਨ ਐਂਟੀਕੋਆਗੁਲੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਚਕ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨੈਦਾਨਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਪ੍ਰੋਥ੍ਰੌਂਬਿਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਊਮੈਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਕੋਆਗੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਥ੍ਰੌਂਬਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਥ੍ਰੌਂਬਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਥਨ: ੧. ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪੁਸਤਿਕਾ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੩. ਚੂਹਾਨਾਸ਼ਕ ਬੈਟ ਅਤੇ ਮਰੇ ਚੂਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ੪. ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜਲਮਈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ: ਬੀਏਐਸਐਫ ਪੀਐਲਸੀ, ਸੇ. ਮਾਈਕਲ'ਸ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਵਿਡਨੇਸ, ਚੇਸ਼ਾਇਰ, WA8 8TJ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਤਾ: ਬੀਏਐਸਐਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ.

ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ: ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ੧੦ਏ, ੧੦ਬੀ ਅਤੇ ੧੦ਸੀ (ਪਾਰਟ), ੧੦ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਗੋਦਰੇਜ਼ ਵਨ, ਪਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾ ਨਗਰ, ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਵਿਖਰੋਲੀ (ਪੂਰਬ), ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦ ੦੭੯, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ।

ਫੈਕਟਰੀ: ਯੂਨਿਟ ਨੰ. ੪, ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆ, ਪੀ. ਓ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ - ੧੪੦੨੦੧।

Punjabi

BASF

We create chemistry

Read Leaflet before use

Flocoumafen 0.005% Block bait

Storm® 0.005% BB

(Rodenticide)

For import only

For Pest Control Operators (P.C.O) use only

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ले

फ्लोकुमाफेन ०.००५% ब्लॉक बेट

स्टॉर्म™ ०.००५% बीबी

(कृंतकनाशी)

आयात के लिए

केवल किट नियंत्रण संचालक (पीसीओ) उपयोग के लिए

Manufactured by: BASF plc, St. Michael's Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, United Kingdom

Imported and re-packed by: BASF India Limited

Registered office : Unit No. 10A, 10B & 10C (Part), 10th Floor, Godrej one, Pirojsha Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra, India.

Factory:

Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur,Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab-140201.

निर्माता: बीएएसएफ पीएलसी, से. माइकल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट, विडनेस, चेशीर, डब्ल्युए८ ८टीजे, युनाइटेड किंग्डम

आयात और पून:पैकिंगकर्ता: बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 10ए, 10बी और 10सी (पार्ट), 10वीं मंजिल, गोदरेज वन, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई - 400 079, महाराष्ट्र, भारत.

फैक्टरी:

यूनिट नं. ४, गांव निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर तहसील डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब-१४० २०१

Consumer care cell : Contact at registered office of BASF India Limited, Tel.: (0)7415002222, E-mail : consumeragro-india@basf.com

Website / वेबसाईट : https://crop-protection.basf.in/en

EPR. Regn. No. BO-24-000-05-AAACB4599E-22

® = Registered Trademark of BASF Group Company

® = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का रजिस्ट्रड ट्रेडमार्क

TM = Trademark of BASF Group Company

TM = बीएएसएफ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क



Harmful



I1215 Purab

Size : 550mm(W)X350mm(H)

ব্যবহার করার পূর্বে লিফলেট পড়ুন

ফ্লোকুমাফেন ০.০০৫% ব্লক বেট

ষ্টর্ম™ ০.০০৫% বি বি

(ইঁদুরনাশক)

কেবলমাত্র আমদানির জন্যে

কেবলমাত্র পেষ্ট কন্ট্রোল অপারেটরদের (P.C.O.) ব্যবহারের জন্যে

ফ্লোকুমাফেন ০.০০৫% ব্লক বেট (বিবি) হচ্ছে ক্ষেতে ও মজুতকরণে ধেড়ে ইঁদুর এবং নেংটি ইঁদুরদের বিভিন্ন প্রজাতির বিরুদ্ধে প্রভাবদায়ক এক শক্তিশালী একক ফীড অ্যান্টিকোঅ্যাগুল্যান্ট।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

ক্রঃ নং	উপাদান	% ওজন/ওজন
১.	ফ্লোকুমাফেন সঃ উঃ	০.০০৫
২.	ডিনাটোনিয়াম বেঞ্জোয়েট	০.০০১
৩.	এরিওগ্লাউসাইন ডিসোডিয়াম সল্ট	০.০২৫
৪.	অ্যানহাইড্রোয়াস সাইট্রিক অ্যাসিড	০.৫
৫.	অর্থো-ফিনাইলফেনল	০.০৫
৬.	অ্যামোরফ্যাস সিলিকা	০.০৫০৭
৭.	সোডিয়াম ক্লোরাইড	০.৩৬৯
৮.	আল্ফা কপার ফথালোসিয়ানাইন	০.১
৯.	ওয়াক্স পাউডার	২৪.৯৮
১০	গমের আটা	৩৬.৯৮
১১.	গমের টুকরো	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ
	মোট	১০০.০০

প্রয়োগ

ব্যবহার	প্রচলিত পোকা	মাত্রা					অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (মিঃগ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (গ্রাঃ)	কিভাবে প্রয়োগ করা	জল (লিটার)		
ক্ষেতে, মজুতকরণে এবং ধান, সোয়াবিন, ও নারকোলের মতো ফসলে ধেড়ে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণের জন্যে	*(রাটুস রাটুস, ব্যান্ডিকোটা বেনগালেন্সিস, টাটেরা ইন্ডিকা এবং মুস মাস্কুলাস)*	০.৭৫-১.০	১৫-২০	বেট ষ্টেশনে ৫-১০ মিটার ব্যবধানে বা সক্রিয় গর্তে। সমস্যা অটল থাকলে ১৪ দিন পর পুনরায় প্রয়োগ করা।	প্রযোজ্য নয়		প্রযোজ্য নয়

ব্যবহারের জন্যে প্রয়োগ ও সুপারিশ : সক্রিয় গর্তের মধ্যে বেট না রাখার ক্ষেত্রে টিন বা পাটির পাত্র, বাঁশ, নারকোল বা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাওয়া অন্য যেকোনো পদার্থের তৈরী বেট ষ্টেশন ব্যবহার করুন। একটা একক ফীডের অনুসরণে ফ্লোকুমাফেন ০.০০৫% বি বি ধেড়ে ইঁদুর এবং নেংটি ইঁদুরদের মারবে। এটা ব্যবহারের জন্যে তৈরী অবস্থার উৎপাদ এবং অন্যান্য খাদ্য পদার্থের সংযোজনের দ্বারা দ্রবীভূত করতে হবে না।

ব্যবহৃত হবার নির্দেশ ও গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম : উপদ্রবযুক্ত এলাকাতে ম্যানুয়াল প্রয়োগ করা। সক্রিয় গর্তের মধ্যে বেট না রাখার ক্ষেত্রে টিন বা পাটির পাত্র, বাঁশ, নারকোল বা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাওয়া অন্য যেকোনো পদার্থের তৈরী বেট ষ্টেশন ব্যবহার করুন। একটা একক ফীডের অনুসরণে ফ্লোকুমাফেন ০.০০৫% বি বি ধেড়ে ইঁদুর এবং নেংটি ইঁদুরদের মারবে। এটা ব্যবহারের জন্যে তৈরী অবস্থার উৎপাদ এবং অন্যান্য খাদ্য পদার্থের সংযোজনের দ্বারা দ্রবীভূত করতে হবে না।

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্যায় : উপদ্রবযুক্ত এলাকাতে ম্যানুয়াল প্রয়োগ করা।

আবহাওয়ার অবস্থা : প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাটি: প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার নজলের প্রকার: উপদ্রবযুক্ত এলাকাতে ম্যানুয়াল প্রয়োগ করা।

মাত্রা : ৫-১০ মিটার ব্যবধানে বেট ষ্টেশনে বা সক্রিয় গর্তে ১৫-২০ গ্রাঃ। সমস্যা অটল থাকলে ১৪ দিন পর পুনরায় প্রয়োগ করা।

মেশানোর জন্যে নির্দেশ: সক্রিয় গর্তের মধ্যে বেট না রাখার ক্ষেত্রে টিন বা পাটির পাত্র, বাঁশ, নারকোল বা স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাওয়া অন্য যেকোনো পদার্থের তৈরী বেট ষ্টেশন ব্যবহার করুন।

পুনঃ-প্রবেশের সময়কাল: প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পিএইচআই: প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগের সময়: প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্প্রে'র সর্বাধিক বার সমেত পুনঃপুনঃতা: প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ফসলের ওপর কোন পর্যায় চলাকালীন ইঁদুরনাশক প্রয়োগিত হবে না : প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এটা বেট ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বিষক্রিয়তা : এই উৎপাদ বিষক্রিয় নয়।

মজুতকরণ : ১. একটা নিরাপদ স্থানে ইহার অরিজিনাল লেবেলযুক্ত কন্টেনারে বেট মজুত করবেন। ইঁদুরনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য সামগ্রী বিশেষতঃ খাদ্য সামগ্রী মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা ইঁদুরনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতেব হবে। ২. ইঁদুরনাশক মজুতকরণের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতে হবে সুনির্মিত, হাওয়াবহুল, সুআলোকিত আর বাতায়িত এবং বাষ্প দ্বারা দূষণ এড়াতে পর্যাপ্ত আয়তনযুক্ত।

সতর্কতা : ১. ইঁদুরনাশক বেটগুলো ও মরা ইঁদুরগুলো স্তনপায়ী প্রাণীদের আকর্ষণ করবে আর তাই ঘরোয়া প্রাণীদের ও বন্য জীবের প্রতি বিপজ্জনক। উৎপাদ মাছ ও জলজ জীবদের প্রতি বিষাক্ত আর তাই জলজচর্চার নিকটে উৎপাদ ব্যবহৃত হবে না। ২. মুখের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়াবেন। কাজের পরে এবং খাওয়া, পান করা ও ধূমপান করার পূর্বে সাবান ও নলের জল দিয়ে আপনার হাত ও প্রভাবিত ত্বক ধোবেন। ৩. শিশুদের, পাখীদের ও ঘরোয়া পশুদের, বিশেষতঃ বেড়াল, কুকুর ও মুরগীদের দ্বারা বেটের নাগাল পাওয়া প্রতিরোধ করবেন। ৪. সেখানে ব্যবহার করবেন না যেখানে খাদ্য, পশুখাদ্য বা জল দূষিতে পরিণত হবে। ৫. সমস্ত মরা ইঁদুর পুড়িয়ে ফেলবেন। নোংরা ফেলার পাত্রে বা জঞ্জালের মধ্যে রেখে দেবেন না।

পাত্রের বিনষ্ট করা: ১. কীটনাশকের নির্মাতা, ফর্মুলাকারী এবং প্রচালনাকারীর দায়িত্ব হবে, প্যাকেজসমূহ বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং ধোয়া তরল এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করা, যাতে পরিবেশগত ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজসমূহের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলো ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন।

বিষাক্ততার লক্ষণসমূহ : আকস্মিক নাকের সঙ্গে সহজেই খেঁতলে যাওয়া বা মৌখিক রক্তক্ষরণ, মল বা মূত্রে রক্ত, সামান্য কাটা বা ছড়ে যাওয়া থেকে অত্যাধিক রক্তক্ষরণ, ফ্যাকাশে মুখ ও শীতল মাড়ি, ক্ষুধাহীনতা, সাধারণ দুর্বলভাব, ত্বকের নীচে ফোলা; গাঁটের চারপাশের ক্ষেত্রে পঙ্গুতার পরিণাম হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: গিলে ফেললে : ব্যক্তি সচেতন ও সজাগ থাকলে, জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দেবেন এবং ১ বা ২ গ্লাস জল পান করতে দেবেন। অচৈতন্য ব্যক্তিকে কখনোই মুখের মধ্যে কোনকিছু দেবেন না। উপস্থিত চিকিৎসক দ্বারা কাঙ্খিত না হওয়া পর্যন্ত বা ছাড়া বমি করতে প্ররোচিত করবেন না। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকবেন। **শ্বাসে গেলে:** রোগীকে মুক্ত-বায়ুতে সরিয়ে আনবেন এবং দেহের তাপমাত্রার প্রতি যত্ন নেবেন। রোগী শ্বাস না নিলে বা শ্বাসকষ্ট হলে, কৃত্রিম শ্বসন দেবেন, চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকবেন। **ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শতার ক্ষেত্রে:** চুল ও আঙুলের নখ সমেত প্রভাবিত দেহাংশ সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে আগাগোড়া ধুইয়ে দেবেন। বেদনা, লালচেভাব বা উত্তেজিতা অটল থাকলে, ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। সকল দূষিত পোশাক আলাদা রাখবেন এবং পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে সাবান ও জল দিয়ে পৃথকভাবে কেচে নেবেন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকবেন। **চোখের সঙ্গে সংস্পর্শতার ক্ষেত্রে:** কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে হালকাভাবে চোখ ধুইয়ে দেবেন। বেদনা, উত্তেজিতা, লালচেভাব বা আলোকাতঙ্ক অটল থাকলে, চক্ষুবিশারদের পরামর্শ নেবেন। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকবেন।

প্রতিষেধক : ভিটামিন কে১ (ফাইটোমেনাডিয়ন) (২ থেকে ৫ মিঃগ্রাঃ/কিঃগ্রাঃ দেহ ওজন) শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন। ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহ, অবস্থাগত প্রামাণিকতা এবং ল্যাবোরেটরী পরীক্ষার একটা সমাবেশ ভিত্তিতে রোগনির্ণয়। একটা কোউমারিন অ্যান্টিকোঅ্যাগুল্যান্ট প্রভাবের একটা ভরসাযোগ্য ইঙ্গিত হলো প্রোথোমবিন সময় নিরূপণ, বিশেষতঃ যদি ক্লিনিক্যাল লক্ষণাদি নামমাত্র হয়। কোউমারিন্স সহ অ্যান্টিকোঅ্যাগুলেশন প্রোথোমবিন সময় বাড়ানোর দিকে নিয়ে যায় এবং সফল চিকিৎসা দ্রুত এটাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনবে।

প্রোথোমবিন সময় পরীক্ষা করা যেখানেই সম্ভব নির্বাহ করতে হবে, কমপক্ষে চিকিৎসা শুরু করার পূর্বে এবং প্রতিষেধক প্রত্যাহারের পর।

সতর্কীকরণ বিবৃতি : ১. পরিচর্যা চলাকালীন ঘনঘন বিরতিতে মরমর বা মরে যাওয়া ইঁদুরদের সন্ধান ও দূর করা, সেগুলো শিকারী পাখী এবং চিলেদের খাওয়ার সম্ভাবনা কমায়। ২. এই লেবেল/লিফলেটে উল্লিখিত সেইসব ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না। ৩. ইঁদুরনাশক বেটগুলো মরা ইঁদুরগুলো পাখীদের আকর্ষণ করতে পারে, আর তাই ঘরোয়া পশুদের ও বন্য-জীবদের প্রতি বিপজ্জনক। ৪. উৎপাদ মাছ ও জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রতি বিষাক্ত আর তাই উৎপাদ জলজচর্চার নিকটে ব্যবহৃত হবে না।

নির্মাতা : বিএএসএফ পিএলসি, সেন্ট মাইকেল'স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট, ওয়াইডনেস, চেশায়ার, ডব্লুএ৮ ৮টিজে, ইউনাইটেড কিংডম

আমদানি এবং পুনঃ প্যাক : বিএএসএফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড,

পঞ্জীকৃত কার্য্যালয় : ইউনিট নং ১০এ, ১০বি এবং ১০সি (পার্ট), ১০ম তলা, গোদরেজ ওয়ান, পিরোজশা নগর, ইস্টার্ণ এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ভিখরোলি (পূর্বে), মুম্বাই - ৪০০ ০৭৯, মহারাষ্ট্র, ভারত।

কারখানা: ইউনিট নং ৪, গ্রাম নিম্বুয়া, পোঃ অঃ মুবারকপুর, মহকুমা ডেরা বাসি, জেলা মোহালি, পাঞ্জাব - ১৪০২০১।

Bengali

ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଲିଫଲେଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଫ୍ଲୋକୁମାଫେନ୍ ୦.୦୦୫% ବ୍ଲକ୍ ବେଟ୍

ଷ୍ଟର୍ମ™ ୦.୦୦୫% ବିବି

(ମୂଷାନାଶକ)

କେବଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ

କେବଳ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅପରେଟର୍ସ (ପି.ସି.ଓ.) ଙ୍କ ଉପଯୋଗ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ଫ୍ଲୋକୁମାଫେନ୍ ୦.୦୦୫% ବ୍ଲକ୍ ବେଟ୍ (ବିବି) ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୀଡ୍ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ଯାହା କ୍ଷେତରେ ତଥା ଗୋଦାମରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

କ୍ର.ନଂ	ଉପାଦାନ	% ଓଜନ/ଓଜନ
୧.	ଫ୍ଲୋକୁମାଫେନ୍ ସ.ଉ.	୦.୦୦୫
୨.	ଡିନାଟୋନିଅମ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍	୦.୦୦୧
୩.	ଏରିଓଗ୍ଲୁସାଇନ୍ ଡାଇସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍ଟ,	୦.୦୨୫
୪.	ଆନ୍‌ହାଇଡ୍ରସ୍ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ	୦.୫
୫.	ଅର୍ଥୋ-ଫିନାଇଲ୍‌ଫେନଲ୍	୦.୦୫
୬.	ଆମୋର୍‌ଫସ୍ ସିଲିକା	୦.୦୫୦୭
୭.	ସୋଡିଅମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍	୦.୩୬୯
୮.	ଆଲ୍‌ଫା କପର୍ ଥାଲୋସିଆନାଇନ୍	୦.୧
୯.	ୱାକ୍ସ ପାଉଡର	୨୪.୯୮
୧୦	ଗହମ ଅଟା	୩୬.୯୮
୧୧.	କଟା ଗହମ	ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ
	ମୋଟ	୧୦୦.୦୦

ଉପଯୋଗ

ବ୍ୟବହାର	ସର୍ବସାମାନ୍ୟ ପୋକ	ମାତ୍ରା				ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ମି.ଗ୍ରା.)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ଗ୍ରାମ୍)	ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି	ପାଣି (ଲିଟର)	
କ୍ଷେତରେ, ଗୋଦାମରେ ଏବଂ ଧାନ, ସୋୟାବୀନ୍ ଓ ନଡ଼ିଆ ଫସଲରେ ମୂଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ	(ରାଟସ୍ ରାଟସ୍, ବାଣ୍ଡିକୋଟା ବେଙ୍ଗାଲେନ୍‌ସିସ୍, ଟାଟେରା ଇଣ୍ଡିକା ଓ ମୁସ୍ ମସ୍‌କୁଲସ୍)	୦.୭୫-୧.୦	୧୫-୨୦	ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସକ୍ରିୟ ଗାତରେ ୫-୧୦ ମି. ଅନ୍ତରରେ । ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଲେ ୧୪ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦୋହରାନ୍ତୁ ।	ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ	ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ

ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉପଯୋଗ ସୁପାରିଶ : ସକ୍ରିୟ ଗାତରେ ରଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ, ଟିଣ ବା ମାଟି ପାତ୍ର, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି ଥୋପ ରଖନ୍ତୁ । ଫ୍ଲୋକୁମାଫେନ୍ ୦.୦୦୫% ବିବି ଥରେ ଖାଇଲେ ମୂଷା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ମରିଯାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶାଇବା ଅନୁଚିତ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଦପ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ : ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତରେ ପ୍ରୟୋଗ । ସକ୍ରିୟ ଗାତରେ ରଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ, ଟିଣ ବା ମାଟି ପାତ୍ର, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି ଥୋପ ରଖନ୍ତୁ । ଫ୍ଲୋକୁମାଫେନ୍ ୦.୦୦୫% ବିବି ଥରେ ଖାଇଲେ ମୂଷା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ମରିଯାଆନ୍ତି । ଏହାକୁ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶାଇବା ଅନୁଚିତ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତରେ ପ୍ରୟୋଗ ।

ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା : ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ମୃତ୍ତିକା: ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ, ଉପକରଣର ପ୍ରକାର, ନୋଜଲର ପ୍ରକାର: ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତରେ ପ୍ରୟୋଗ ।

ମାତ୍ରା : ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସକ୍ରିୟ ଗାତରେ ୫-୧୦ ମି. ଅନ୍ତରରେ ୧୫-୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ । ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଲେ ୧୪ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦୋହରାନ୍ତୁ ।

ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସକ୍ରିୟ ଗାତରେ ରଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ, ଟିଣ ବା ମାଟି ପାତ୍ର, ବାଉଁଶ, ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି ଥୋପ ରଖନ୍ତୁ ।

ପୁନଃପ୍ରବେଶ ଅବଧି: ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ପିଏଚଆଇ: ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ : ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସିଞ୍ଚନ ସଂଖ୍ୟା: ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଫସଲରେ ମୂଷାନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ: ଏହା ଥୋପ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ପାଦପ ବିଷାକ୍ତତା : ଉତ୍ପାଦ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ମହଜୁଦକରଣ : ୧. ଥୋପକୁ ମୂଳ ଲେବଲ୍ ଲଗା ପାତ୍ରରେ ହିଁ ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ମୂଷାନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାସ୍ କରି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ମୂଷାନାଶକର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଖାଲି ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ୨. ମୂଷାନାଶକ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୃହ ବା ପରିସରଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ଆଲୋକିତ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍ ଓ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିବା ଦରକାର ।

ସତର୍କତା : ୧. ମୂଷାନାଶକ ଥୋପ ଆଉ ମୃତ ମୂଷା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଘରୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ । ଉତ୍ପାଦଟି ମାଛ ଆଉ ଜଳଜ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ, ସୁତରାଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆକ୍ୱାକଲ୍‌ଚର୍ ପାଖଆଖରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ । ୨. ତୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ । କାମ ସରିବା ପରେ ଆଉ ଖାନ-ପାନ, ଧୂମପାନ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜ ହାତ ଆଉ ଅନାବୃତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ନଳପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ୩. ଥୋପ ପିଲାଛୁଆ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ, ବିଶେଷ ରୂପେ ବିଲେଇ, କୁକୁର ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ୪. ଖାଦ୍ୟ, ଚାରା ବା ପାଣି ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୫. ମୃତ ମୂଷାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜାଳିଦିଅନ୍ତୁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳିଆ ଡବା କି ମଇଳା ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପାତ୍ରର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ: ୧. ଏହା ନିର୍ମାତା, କୀଟନାଶକ ଫର୍ମୁଲେଟର୍ ଏବଂ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିମ୍ବା ବଳକା ପଦାର୍ଥର ନିଷ୍କାସନ ଓ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ କରିବେ ଯେପରି ତାହା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁନଥିବ । ୨. ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ନକରିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତତା ଲକ୍ଷଣ : ବେଳେବେଳେ ନାକ ବା ତୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ସହଜରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ଝାଡ଼ା-ମୂତ୍ରରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ, ଛୋଟ କଟା ସ୍ଥାନ ବା ଖଣ୍ଡିଆରୁ ବେଶି ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ, କଷ୍ଟକର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ତୁଣ୍ଡ ଶେତା ଦିଶିବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମାଢ଼ି, ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ଦୁର୍ବଳତା, ଚମ ତଳେ ଫୁଲାପଣ, ଗଣ୍ଠି ଆଖପାଖରେ ହୋଇଥିଲେ ଛୋଟାପଣ ବି ଘଟିପାରେ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ଯଦି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସଚେତ ଓ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଧୋଇ ୧ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଣେ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । **ଯଦି ନାକରେ ଆଘ୍ରାଣ କରାଯାଇଥାଏ:** ରୋଗୀକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କର ଶାରିରୀକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ରୋଗୀ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । **ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ:** ପ୍ରଭାବିତ ଅଙ୍ଗକୁ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ କେଶ ଓ ନଖ ସନ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ୍ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଦାହ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଅଲଗା ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । **ଯଦି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଏ:** ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଖିକୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛାଟି ଧୁଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଦାହ, ଲାଲ୍ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଫୋବିଆ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : ଭିଟାମିନ କେ୧ (ଫାଇଟୋମେନାଡିଓନ୍) (୨ ରୁ ୫ ମି.ଗ୍ରା./ପ୍ରତି କେଜି ଦୈହିକ ଓଜନ) ର ଇନ୍‌ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍‌ସନ୍ । ନିଦାନର ଆଧାର ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସାଇନ୍ ଙ୍କ ସମଷ୍ଟି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଲାବୋରେଟରୀ ପରୀକ୍ଷଣ । କୁମାରିନ୍ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ'ର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ଥିତିକରଣ । କୁମାରିନ୍‌ସ ସହିତ ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲେଶନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସଫଳ ଉପଚାର ଏହାକୁ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଆସିବ ।

ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଅତି କମରେ ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ୱିଥ୍‌ଡ୍ର କରାଯିବା ପରେ ।

ସତର୍କତାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ : ୧. ଉପଚାର ଅବଧିରେ ମୋରିବଣ୍ଡ ଆଉ ମଲା ମୂଷା ବାରମ୍ବାର ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କରୁରୀ, ଯେପରି ପରଭକ୍ଷୀ ଓ ମଡ଼ଖିଆମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା କମିଯିବ । ୨. ଏହାର ଲେବଲ୍/ଲିଫଲେଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୩. ମୂଷାନାଶକ ଥୋପ ଆଉ ମୃତ ମୂଷା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଓ ବଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ । ୪. ଉତ୍ପାଦ ମାଛ ଓ ଜଳଜ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ଲାଗି ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ, ସୁତରାଂ ଆକ୍ୱାକଲ୍‌ଚର୍ ପାଖଆଖରେ ଉତ୍ପାଦ ଉପଯୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ ।

ଉତ୍ପାଦକ : ବିଏଏସ୍‌ଏଫ୍ ପିଏଲ୍‌ସି, ସେଣ୍ଟ ମାଇକେଲ୍'ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ୱିଡନ୍ସ, ଚେଶାୟର, ଡବ୍ଲୁଏ୮ ୮ଟିଜେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ।

ଆମଦାନିକାରୀ ଓ ରି-ପ୍ୟାକିଙ୍ଗକାରୀ: ବିଏଏସଏଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍

ନିବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର ୧୦ଏ, ୧୦ବି ଏବଂ ୧୦ସି (ପାର୍ଟ), ୧୦ମ ମହଲା, ଗୋଦରେଜ୍ ୱନ, ପିରୋଜଶା ନଗର, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହାଇୱେ, ବିକ୍ରୋଲି (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବାଇ - ୪୦୦ ୦୭୯, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ।

କାରଖାନା: ୟୁନିଟ୍ ନଂ ୪, ଗ୍ରାମ - ନିମ୍ବୁଆ, ପୋ.ଅ. ମୁବାରକ୍‌ପୁର, ତହସିଲ୍-ଡେରାବାସି, ଜିଲ୍ଲା - ମୋହାଲି, ପଞ୍ଜାବ - ୧୪୦୨୦୧ ।

Oriya

ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿರಿ

ಫ್ಲೋಕುಮಾಫೆನ್ 0.005% ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಟ್

ಸ್ಟಾರ್ಮ್™ 0.005% ಬಿಬಿ

(ಇಲಿನಾಶಕ)

ಕೇವಲ ಆಮದುಗಾಗಿ

ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ (ಪಿ.ಸಿ.ಓ.) ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ

ಫ್ಲೋಕುಮಾಫೆನ್ 0.005% ಬ್ಲಾಕ್ ಬೈಟ್ (ಬಿಬಿ) ಸ್ಟಾರ್ಮ್ 0.005% ಬಿಬಿ, ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಏಕ ಆಂಟಿ ಕೋವಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಡೆಂಟ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಅಂಶಗಳು	% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
1.	ಫ್ಲೋಕುಮಾಫೆನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ	0.005
2.	ಡೆನಾಟೋನಿಯಮ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್	0.001
3.	ಎರಿಯೋಗ್ಲೌಸಿನ್ ಡೈಸೋಡಿಯಂ ಲವಣ	0.025
4.	ನಿರ್ಜಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್	0.5
5.	ಆರ್ಥೋ- ಫಿನೈಲ್ ಫಿನಾಲ್	0.05
6.	ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಿಲಿಕಾ	0.0507
7.	ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್	0.369
8.	ಆಲ್ಫಾ ಕಾಪರ್ ಥ್ಯಾಲ್ಯೋಸೈಯನೈನ್	0.1
9.	ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್	24.98
10.	ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು	36.98
11.	ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
	ಒಟ್ಟು	100.00

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ

ಬಳಕೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಟಗಳು	ಡೋಸೇಜ್				ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶ (ಮಿಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು	ನೀರು (ಲೀಟರ್)	
ಹೊಲ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ	*(ರಾಟಸ್, ರಾಟಸ್ ಬಂಡಿ ಕೋಟಾ, ಬೆಂಗಲೆನ್ಸಿಸ್, ಟಟೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಮತ್ತು ಮುಸ್ ಮುಸ್ಕುಲಸ್)*	0.75-1.0	15-20	ಆಮಿಷ ಆಹಾರವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಬಿಲದಲ್ಲಿ 5-10 ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು: ಆಮಿಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಟಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು, ಬಿದಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫ್ಲೋಕುಮಾಫೆನ್ 0.005% ಬಿಬಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತಿಂದರೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು.

ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು: ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಆಮಿಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಟಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು, ಬಿದಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಫ್ಲೋಕುಮಾಫೆನ್ 0.005% ಬಿಬಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತಿಂದರೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಂತ: ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ, ನಾಝಲ್‌ನ ಮಾದರಿ: ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು

ಡೋಸೇಜ್: ಆಮಿಷ ಆಹಾರವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಬಿಲದಲ್ಲಿ 5-10 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 15-20 ಗ್ರಾಂ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಇಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ 14 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಆಮಿಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಟಿನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು, ಬಿದಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಮರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಹೆಚ್‌ಐ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆವರ್ತನ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಇಲಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದ ಹಂತಗಳು: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 1. ಬೈಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಕಂಟೇನರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವ ಇಲಿ ವಿಷನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಇಲಿ ವಿಷನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಿರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಇಲಿ ವಿಷನಾಶಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಇಲಿ ವಿಷನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು, ಆವಿಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರದೂಷಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಈ ಇಲಿ ವಿಷದ ಬೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಇಲಿಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಲಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಬಾಯಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಮಕ್ಕಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳು ಬೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. 4. ಆಹಾರ, ಮೇವು ಅಥವಾ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. 5. ಸತ್ತ ಇಲಿಗಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.

ಧಾರಕಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಕಲ್ಮಷವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪ್ರದೂಷಿತಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವುದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮರು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಬಾರದು. 3.ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಬಿಡಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂಗೇಟು ಬೀಳುವುದು, ಆಗಾಗ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಸಣ್ಣಗಾಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸವೆತಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳು ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು, ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ (ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು), ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಊತ; ಕೀಲುಗಳ ಸುತ್ತ ಊತವಿದ್ದರೆ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಹೊಟ್ಟೆಸೇರಿದ್ದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇದ್ದು ಎಚ್ಚರವಿದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆಯ ವಿನಹ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ :** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್‌ರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ:** ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಸಹಿತ, ಶರೀರದ ದೂಷಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ತ್ವಚೆ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸದೆ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆಯಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರೆ:** ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ1 (ಫೈಟೋಮೆನಾಡಿಯೋನ್) ಅನ್ನು ದೇಹದ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ರಿಂದ 5 ಮಿಗ್ರಾಂ ಗಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂದರ್ಭಿಕ ತಕ್ಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಮರಿನ್ ಆಂಟಿ ಕೋವಾಗ್ಯುಲೆಂಟ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಟೈಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಮರಿನ್ ಗಳಿಂದ ಆಂಟಿ ಕೊವಾಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವಿಷನಿವಾರಕವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಟೈಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಪರಭಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಸ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ವಿನಹ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಇಲಿ ವಿಷದ ಬೈಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಇಲಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 4. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಲಕೃಷಿಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ತಯಾರಕರು: ಬಿಎಎಸ್‌ಎಫ್ ಪಿ ಎಲ್ ಸಿ, ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಿಡ್ನೆಸ್, ಚೆಶರ್, WAB 8TJ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್

ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು: ಬಿಎಎಸ್ ಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್: ಯೂನಿಟ್ ನಂ. 10ಎ, 10ಬಿ ಮತ್ತು 10ಸಿ (ಪಾರ್ಟ್), 10ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ವನ್, ಪಿರೋಜ್‌ಶಾ ನಗರ್, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ, ವಿಖ್ರೋಳಿ (ಪೂರ್ವ), ಮುಂಬಯಿ-400 079, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಯುನಿಟ್ ನಂ. 4, ವಿಲೇಜ್ ನಿಂಬುವಾ, ಪೋ. ಆ. ಮುಬಾರಕ್‌ಪುರ-140201, ತಶೀಲು ಡೇರಾ ಬಾಶಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಹಾಲಿ, ಪಂಜಾಬ್.

Kannada

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి

ఫ్లోకుమాఫెన్ 0.005% బ్లాక్ బెయిట్

స్టోర్మ్™ 0.005% బిబి

(ఎలుకలనాశిని)

దిగుమతి చేసుకునేందుకు మాత్రమే

పెస్ట్ కంట్రోల్ ఆపరేటర్లు (పి.సి.ఒ.) మాత్రమే ఉపయోగించేందుకు

ఫ్లోకుమాఫెన్ 0.005% బ్లాక్ బెయిట్ (బిబి) అనేది పొలంలో మరియు స్టోరేజ్‌లో అనేక ఎలుకల మరియు చిట్టెలుకల జాతులపై ప్రభావవంతంగా పనిచేసే శక్తివంతమైన సింగిల్ ఫీడ్ యాంటీకోఆగులంట్.

రసాయనిక మిశ్రమం:

క్ర. సంఖ్య	పదార్థం	% బ/బ
1.	ఫ్లోకుమాఫెన్ ఎ.ఐ.	0.005
2.	డెనాటోనియమ్ బెంజోయేట్	0.001
3.	ఎరియోగ్లౌసిన్ డైసోడియం సాల్ట్	0.025
4.	యాన్హైడ్రస్ సిట్రిక్ యాసిడ్	0.5
5.	ఆర్థో-ఫెనైల్‌ఫినాల్	0.05
6.	అమోర్ఫస్ సిలికా	0.0507
7.	సోడియం క్లోరైడ్	0.369
8.	అల్ఫా కాపర్ థాలోసియానైన్	0.1
9.	మైనం పౌడర్	24.98
10.	గోధుమ పిండి	36.98
11.	గోధుమ నూక	కావలసినంత
	మొత్తం	100.00

వినియోగించుట

ఉపయోగించుట	మామూలు కీటకాలు	మోతాదు				వేచివుండవలసిన సమయం (రోజులు)
		స.ప. (మిగ్రా)	సూత్రీకరణ (గ్రా)	ఎలా వినియోగించాలి	నీరు (లీటర్లు)	
పొలంలో, స్టోరేజ్‌లో మరియు వరి, సోయాబీన్ మరియు కొబ్బరి లాంటి పంటల్లో ఎలుకలను నియంత్రించడానికి.	*(రాటస్ రాటస్, బండికోట బెంగాలెన్సిస్, తాతెరా ఇండికా మరియు మూస్ ముస్కులస్)*	0.75-1.0	15-20	బెయిట్ స్టేషన్‌లో లేదా క్రియాశీలంగా ఉన్న కన్నంలో 5-10 నిమిషాల విరామంలో. సమస్య ఉండిపోతే 14 రోజుల తరువాత తిరిగి వినియోగించాలి.	వర్తించదు	వర్తించదు

వినియోగించుట మరియు ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు: క్రియాశీలంగా ఉన్న కన్నాల్లో బెయిట్‌ని పెట్టనప్పుడు డబ్బాలు లేదా మట్టి కుండలు, వెదురుబొంగు, కొబ్బరి లేదా స్థానికంగా లభించే ఏదైనా ఇతర మెటీరియల్‌తో తయారు చేసిన బెయిట్ స్టేషన్‌లను ఉపయోగించండి. ఫ్లోకుమాఫెన్ 0.005% బిబి ఎలుకలు మరియు చిట్టెలుకలను ఒక్కసారి తిన్న వెంటనే చంపుతాయి. ఇది ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మరియు ఇతర ఆహార పదార్థాలను కలపడం ద్వారా పలచన చేయకూడదు.

ఉపయోగించవలసిన దిశ మరియు మొక్క రక్షణ పరికరాలు: తెగులు సోకిన ప్రాంతాల్లో మాన్యువల్‌గా వినియోగించాలి. క్రియాశీలంగా ఉన్న కన్నాల్లో బెయిట్‌ని పెట్టనప్పుడు డబ్బాలు లేదా మట్టి కుండలు, వెదురుబొంగు, కొబ్బరి లేదా స్థానికంగా లభించే ఏదైనా ఇతర మెటీరియల్‌తో తయారు చేసిన బెయిట్ స్టేషన్‌లను ఉపయోగించండి. ఫ్లోకుమాఫెన్ 0.005% బిబి ఎలుకలు మరియు చిట్టెలుకలను ఒక్కసారి తిన్న వెంటనే చంపుతాయి. ఇది ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది మరియు ఇతర ఆహార పదార్థాలను కలపడం ద్వారా పలచన చేయకూడదు.

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ: తెగులు సోకిన ప్రాంతాల్లో మాన్యువల్‌గా వినియోగించాలి.

వాతావరణ పరిస్థితులు: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

నేల: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్; పరికరాల రకం; నాజిల్ రకం: తెగులు సోకిన ప్రాంతాల్లో మాన్యువల్‌గా వినియోగించాలి.

మోతాదు: బెయిట్ స్టేషన్‌లో లేదా క్రియాశీల కన్నాల్లో 5-10 నిమిషాల విరామంలో 15-20 గ్రాముల సూత్రీకరణ. సమస్య ఉండిపోతే 14 రోజుల తరువాత తిరిగి వినియోగించాలి.

మిశ్రమం చేసేందుకు సూచన: క్రియాశీలంగా ఉన్న కన్నాల్లో బెయిట్‌ని పెట్టనప్పుడు డబ్బాలు లేదా మట్టి కుండలు, వెదురుబొంగు, కొబ్బరి లేదా స్థానికంగా లభించే ఏదైనా ఇతర మెటీరియల్‌తో తయారుచేసిన బెయిట్ స్టేషన్‌లను ఉపయోగించండి.

పునఃప్రవేశ వ్యవధి: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

పిహెచ్ఐ: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

వినియోగించవలసిన సమయం: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

గరిష్ట పిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరుచుదనం: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

ఏ పంటపై కూడా ఎలుకలనాశినిలను అప్లై చేయకూడని దశలు: వర్తించదు, ఎందుకంటే దీనిని బెయిట్ స్టేషన్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

మొక్కకు విషతుల్యత: ఉత్పాదన మొక్కను విషతుల్యం చేయదు.

నిల్వ చేయుట: 1. బెయిట్‌ని అసలు లేబుల్ గల డబ్బాలో సురక్షితమైన చోట నిల్వ చేయండి. ఎలుకలనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువులకు, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగించే గది లేదా ప్రాంగణానికి దూరంగా వేరే గది లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వచేయాలి లేదా ఎలుకలనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి వేరే అల్మరాల్లో తాళం వేసి ఉంచాలి. 2. ఆవిరితో మలినపడటాన్ని నివారించేందుకు వీలుగా ఎలుకలనాశిని నిల్వ చేసేందుకు ఉద్దేశించిన గది లేదా ప్రాంగణం బాగా నిర్మించినదై, గాలి వచ్చేదై, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ వచ్చేదై మరియు తగినంత వైశాల్యంతో నిర్మించినదై ఉండాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. ఎలుకలనాశిని బెయిట్స్ మరియు చనిపోయిన ఎలుకలు క్షీరదాలను ఆకర్షించవచ్చు, కాబట్టి పెంపుడు జంతువులకు మరియు వన్య ప్రాణులకు ప్రమాదకరం. చేపలకు మరియు జల చరాలకు ఉత్పాదన విషపూరితం కావున, ఉత్పాదనను రొయ్యల, చేపల పెంపకానికి సమీపంలో ఉపయోగించకూడదు. 2 . నోటికి తగలనివ్వకండి. పని పూర్తయిన తరువాత మరియు తినడానికి, తాగడానికి మరియు ధూమపానం చేయడానికి ముందు మీ చేతులు మరియు బహిర్గతమైన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు కొళాయి నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. 3. పిల్లలు, పక్షులు మరియు పెంపుడు జంతువులకు, ప్రత్యేకించి పిల్లలు, కుక్కలు మరియు కోళ్ళకు ప్రవేశసౌలభ్యాన్ని నిరోధించండి. 4. ఆహారం, దాణా లేదా నీరు కలుషితం కాగలిగిన చోట ఉపయోగించకండి. 5. చనిపోయిన ఎలుకలన్నిటినీ తగులబెట్టండి. చెత్తకుండీలు లేదా చెత్త టిప్స్‌లో వాటిని పెట్టకండి.

ఉపయోగించిన డబ్బాలను విసర్జించుట: 1. ప్యాకేజీను లేదా మిగిలిపోయిన మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం లేని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే అరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

విషపు లక్షణాలు: అప్పుడప్పుడు ముక్కు లేదా మౌఖిక రక్తస్రావంతో సులభంగా కమిలడం, మలంలో లేదా మూత్రంలో రక్తం, స్వల్పంగా కోసుకుపోయిన వాటి నుండి లేదా ఒరిపిడి నుండి అమితంగా రక్తస్రావం, శ్వాసతీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, నోరు పాలిపోవుట మరియు చల్లని చిగుళ్ళు, ఆకలిలేకపోవడం, సాధారణ నీరసం, చర్మం క్రింద వాపు; కీళ్ళ చుట్టూ ఉన్నప్పుడు కుంటితనం కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స: మింగితే: బాధితుడు స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోరు కడిగి తాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి గుండా ఎప్పుడూ ఏదీ ఇవ్వకండి. డాక్టరుకు కాల్ చేయండి. చికిత్స చేస్తున్న ఫిజీషియన్ కోరితే తప్ప వాంతులు చేయించకండి. వెంటనే డాక్టరుకు కాల్ చేయండి. **పీల్చితే:** రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. రోగి శ్వాస తీసుకోలేకపోతుంటే లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి. ఫిజీషియన్‌ని సంప్రదించండి. వెంటనే డాక్టరుకు కాల్ చేయండి. **ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే:** జుట్టు మరియు చేతివేళ్ళ గోళ్ళ కిందతో సహా, మలినపడిన శరీర అవయవాలను సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా కడగండి. నొప్పి, ఎర్రబడటం లేదా మంటపుట్టడం ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. మలినపడిన దుస్తులను వేరుచేసి ఉపయోగించడానికి ముందు సబ్బు మరియు నీటితో వేరుగా బాగా ఉతకాలి. వెంటనే డాక్టరుకు కాల్ చేయండి. **ఒకవేళ కళ్ళకు తగిలితే:** కనీసం 15 నిమిషాల సేపు ఎక్కువ నీటితో బాగా కడగండి. నొప్పి, మంటపుట్టడం, ఎర్రబడటం లేదా ఫోటోఫోబియా ఉండిపోతే, కళ్ళ డాక్టరును సంప్రదించండి. వెంటనే డాక్టరుకు కాల్ చేయండి.

విరుగుడు: విటమిన్ కె1 (ఫైటోమెనాడియోన్) (2 నుండి 5మిగ్రా/కిలో శరీరం బరువుకు). క్లినికల్ చిహ్నాలు, సందర్భోచిత సాక్ష్యాధారాలు మరియు లేబొరేటరీ పరీక్షలపై రోగనిర్ధారణ ఆధారపడి ఉంటుంది. కొమారిన్ యాంటీకోగులంట్ యొక్క నమ్మకమైన సూచన, ప్రత్యేకించి క్లినికల్ చిహ్నాలు తక్కువగా ఉంటే ప్రోథ్రోంబిన్ టైమ్ యొక్క నిర్ధారణ. కొమారిన్‌తో యాంటీకోఆగులేషన్ ప్రోథ్రోంబిన్ టైమ్‌లో పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది మరియు విజయవంతంగా చికిత్స చేయడం వల్ల అది త్వరగా మామూలు లెవెల్‌కి తిరిగొస్తుంది.

వీలైన చోటల్లా ప్రోథ్రోంబిన్ టైమ్ పరీక్ష, చికిత్స ప్రారంభం కావడానికి కనీసం ముందు మరియు విరుగుడును ఉపసంహరించుకున్న తరువాత నిర్వహించబడుతుంది.

హెచ్చరిక ప్రతిపాదన: 1. చికిత్స సమయంలో తరచు విరామాల్లో మోరిబండ్ మరియు చనిపోయిన ఎలుకల కోసం శోధన మరియు తొలగించడం ప్రిడేటర్లు మరియు స్కావెంజర్లు వాటిని తినే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది. 2. ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నవాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. 3. ఎలుకనాశిని బెయిట్‌లు మరియు చనిపోయిన ఎలుకలు జంతువులను ఆకర్షించవచ్చు కాబట్టి, పెంపుడు జంతువులకు మరియు వన్య ప్రాణులకు ప్రమాదకరం. 4. చేపలకు మరియు జల చరాలకు ఉత్పాదన విషపూరితం కావున, ఉత్పాదనను రొయ్యల మరియు చేపల పెంపకానికి దగ్గరలో ఉపయోగించకూడదు.

తయారుచేసినవారు: బిఎఎస్ఎఫ్ పిఎల్‌సి, సెయింట్ మైకేల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, విడ్నెస్, చెషైర్, డబ్ల్యు8 8టిజె, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్.

తయారుచేసినవారు మరియు ప్యాక్ చేసినవారు: బిఎఎస్ఎఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్.

రిజిస్టర్డు కార్యాలయం: యూనిట్ నం. 10ఎ, 10బి మరియు 10సి (పార్ట్), 10వ అంతస్తు, గోద్రేజ్ వన్, పిరోజ్‌షా నగర్, ఈస్టర్న్ ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే, విఖ్రోలీ (తూర్పు), ముంబయి-400 079. మహారాష్ట్ర, ఇండియా.

ఫ్యాక్టరీ: యూనిట్ నం. 4, గ్రామం నింబువా, పి.ఒ. ముబారక్‌పూర్, దెరాబస్సీ తాలూకా, మొహాలీ జిల్లా, పంజాబ్- 140201.

Telugu

பயன்படுத்தும் முன்னர் கையேட்டைப் படிக்கவும்

ஃப்ளோகூமாஃபென் 0.005% ப்ளாக் பெய்ட்

ஸ்டோர்ம்™ 0.005% பிபி

(எலிக்கொல்லி)

இறக்குமதிக்கு மட்டும்

பூச்சிக்கொல்லி ஆபரேட்டர்கள் (P.C.O) பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

ஃப்ளோகூமாஃபென் 0.005% ப்ளாக் பெய்ட் (பிபி) ஒரு சக்திவாய்ந்த ஒருமுறை சாப்பிடும் இரத்த உறைவுத் தடுப்பி, இது பல வகையான எலிகள் மற்றும் சுண்டெலிகளை வயல்களிலும் சேமிப்பு கிடங்குகளிலும் கட்டுப்படுத்தும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை:

வ.எண்	மூலப்பொருள்	% எடை/எடை
1.	ஃப்ளோகூமாஃபென் ஏ.ஐ.	0.005
2.	டினடோனியம் பென்ஸொயேட்	0.001
3.	எரியோக்லாசின் டிசோடியம் சால்ட்	0.025
4.	அன்ஹைட்ரெஸ் சைட்ரிக் ஆசிட்	0.5
5.	ஆர்தோ-ஃபினைல்ஃபினோல்	0.05
6.	அமோர்ஃபோஸ் சிலிகா	0.0507
7.	சோடியம் குளோரைட்	0.369
8.	அல்ஃபா காப்பர் ஃபதலோசையானின்	0.1
9.	வாக்ஸ் பௌடர்	24.98
10	வீட் ஃப்ளோர்	36.98
11.	கட் வீட்	தேவைக்கேற்ப
	மொத்தம்	100.00

பயன்பாடு

பயன்பாடு	பொதுவான பூச்சிகள்	மருந்தளவு				காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		வீ. பொ. (மிகி)	தயாரிப்பு (கிராம்)	பயன்படுத்தும் முறை	தண்ணீர் (லிட்)	
வயல் மற்றும் சேமிப்பு கிடங்குகளில் நெல், சோயாபீன் மற்றும் தேங்காய் போன்றவைகளை எலித் தொல்லையிலிருந்து பாதுகாக்க	*(ராட்டஸ் ராட்டஸ், பண்டிகோடா பெங்காலன்சிஸ், டாட்டிரா இண்டிகா அண்ட் மியூஸ் மஸ்குலஸ்)*	0.75-1.0	15-20	5-10 மீட்டர் இடைவெளிகளில் இரை பொறிகளில் அல்லது எலிப் பொந்துகளில் இட வேண்டும். எலித் தொல்லை தொடர்ந்திருந்தால், 14 நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பயன்படுத்தவும்.	பொருந்தாது	பொருந்தாது

பயன்படுத்தல் மற்றும் பயன்பாடு பரிந்துரை: எலிப் பொந்துகளில் பயன்படுத்த இயலாத போது தகரம் அல்லது மண் பாத்திரங்கள், மூங்கில், தேங்காய் ஓடு அல்லது உள்ளூரில் கிடைக்கும் வேறு பொருகளை இரை பொறிகளாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு முறை சாப்பிடுவதாலேயே ஃப்ளோகூமாஃபென் 0.005% பிபி எலிகளையும் சுண்டெலிகளையும் கொன்றுவிடும். பயன்படுத்த தயாராகக் கிடைக்கும் இதனுடன் வேறு உணவுப் பொருள்கள் எதையும் சேர்க்கக்கூடாது.

பயன்படுத்தும் முறையும் பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகளும்: எலித் தொல்லை இருக்கும் இடங்களில் கை முறையாக இதைப் போட வேண்டும். எலிப் பொந்துகளில் பயன்படுத்த இயலாத போது தகரம் அல்லது மண் பாத்திரங்கள், மூங்கில், தேங்காய் ஓடு அல்லது உள்ளூரில் கிடைக்கும் வேறு பொருகளை இரை பொறிகளாகப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு முறை சாப்பிடுவதாலேயே ஃப்ளோகூமாஃபென் 0.005% பிபி எலிகளையும் சுண்டெலிகளையும் கொன்றுவிடும். பயன்படுத்த தயாராகக் கிடைக்கும் இதனுடன் வேறு உணவுப் பொருள்கள் எதையும் சேர்க்கக்கூடாது.

பயன்படுத்தும் காலம்/பயிர்ப் பருவம்: எலித் தொல்லை இருக்கும் இடங்களில் கை முறையாக இதைப் போட வேண்டும்.

வானிலை நிலவரம்: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

மண்: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

தெளிக்கும் விதம், உபகரண வகை, நாஸில் வகை: எலித் தொல்லை இருக்கும் இடங்களில் கை முறையாக இதைப் போட வேண்டும்.

மருந்தளவு: 15-20 கிராம் அளவில் இத்தயாரிப்பை 5-10 மீட்டர் இடைவெளிகளில் இரை பொறிகளில் அல்லது எலிப் பொந்துகளில் இட வேண்டும். எலித் தொல்லை தொடர்ந்திருந்தால், 14 நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் பயன்படுத்தவும்.

கலப்பதற்கான வழிமுறைகள்: எலிப் பொந்துகளில் பயன்படுத்த இயலாத போது தகரம் அல்லது மண் பாத்திரங்கள், மூங்கில், தேங்காய் ஓடு அல்லது உள்ளூரில் கிடைக்கும் வேறு பொருகளை இரை பொறிகளாகப் பயன்படுத்தலாம்

மறு நுழைவு காலம்: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

பிஹெச்ஐ: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

தெளிப்பு வேளை: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான தெளிப்புகள் உட்பட தெளிப்பு முறை: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

எலிக்கொல்லியை எந்தப் பயிரின் மீதும் பயன்படுத்தக் கூடாத நிலைகள்: பொருந்தாது, இரை பொறிகளில் இது பயன்படுத்தப்படும்.

தாவரநச்சு: இத்தயாரிப்பு தாவரநச்சு ஏற்படுத்தாது.

பத்திரப்படுத்துதல்: 1. இத்தயாரிப்பை அதன் ஒரிஜினல் கொள்கலனில் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து வைக்க வேண்டும். எலிக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து குறிப்பாக உணவு பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அறைகளில் அல்லது தனி அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2. இவ்வாறு எலிக்கொல்லி மருந்து சேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டவையாகவும், உலர்ந்து நல்ல பிரகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீள அகலத்துடன் மருந்து காற்று சுத்தமான காற்றுடன் கலந்து மாசுபடுத்தாத விதமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. எலிக்கொல்லிகள் மற்றும் இறந்த எலிகள் பாலூட்டிகளைக் கவர்ந்திழுக்கும் என்பதால் இவை வீட்டு விலங்குகளுக்கும், வனவிலங்குகளுக்கும் ஆபாத்தானவை. நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இத் தயாரிப்பு கொடிய நஞ்சாக இருக்கும் என்பதால், மீன்வளர்ப்பு இடக்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. மருந்து வாயில் படாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மருந்தைக் கையாண்ட பிறகு நன்றாக சோப்பு போட்டு உடலைச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும், சுத்தம் செய்துகொள்ளாமல் சாப்பிடுவது, குடிப்பது, புகைபிடிப்பது கூடாது. 3. எலிக்கொல்லி இரையை குழந்தைகள், பறவைகள், வீட்டு விலங்குகளான பூனைகள், நாய்கள் மற்றும் கோழிகள் ஆகியவற்றிடமிருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும். 4. உணவுகள், தீவனங்கள் அல்லது நீர் ஆகியவை மாசுபட ஏதுவாகும் இடங்களுக்கு அப்பால் இதை பாதுகாப்பாக வைக்கவும் 5. இறந்து போயிருக்கும் எலிகளையும் சுண்டெலிகளையும் எரித்துவிட வேண்டும். இறந்தவைகளை குப்பைத் தொட்டியில் போடக் கூடாது.

காலி பாத்திரங்களை அகற்றுதல்: 1. மருந்தைத் தயாரித்தவர்களும் பயன்படுத்துபவர்களும் தங்கள் பொறுப்பாக காலி பேக்கேஜுகளை அல்லது மீந்து விட்ட மருந்தையும் பாதுகாப்பான முறையில் சுற்றுச் சூழலுக்கும் நீர்நிலைகளுக்கும் மாசு ஏற்படாதவாறு அகற்ற வேண்டும். 2. காலி டப்பாக்கள் மறுஉபயோகம் ஆகும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. கொள்கலன்களை உடைத்து உயிரினங்கள் நடமாட்டமில்லாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: அவ்வப்போது நாசி அல்லது வாய்வழி இரத்தப்போக்கு, மலம் அல்லது சிறுநீரில் இரத்தம், சிறிய வெட்டுக்கள் அல்லது சிராய்ப்புகளிலிருந்து அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கு, சுவாசத்தில் சிரமம், வெளிர் வாய் மற்றும் குளிர்ந்த ஈறுகள், பசியின்மை, பொதுவான பலவீனம், சருமத்தின் கீழ் வீக்கம்; மூட்டுகளைச் சுற்றி இருக்கும்போது வாதம் ஏற்படலாம்.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: நோயாளி சுயநினைவுடன் துடிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளித்த பிறகு 1 அல்லது 2 டம்ளர் குடிநீரைக் குடிக்கக் கொடுக்கவும். சுயநினைவு இழந்திருக்கும் ஒருவரை வாயில் எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவ உதவி அளிக்கும் மருத்துவர் சொல்லாத வரையில் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. உடனடியாக டாக்டரை அழையுங்கள். **சுவாசித்திருந்தால்:** நோயாளியை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் வைப்பநிலையை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். நோயாளிக்கு சுவாச சிரமம் இருந்தால் அல்லது நோயாளியால் சுவாசிக்க முடியாவிட்டால், செயற்கை சுவாசம் அளிக்க வேண்டும், மருத்துவருடன் ஆலோசிக்கவும். உடனடியாக டாக்டரை அழையுங்கள். **சருமத்தில் மருந்து தெளித்திருந்தால்:** மாசுபட்ட உடற்பகுதியை சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீரில் முடி மற்றும் நக இடுக்குகளையும் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். வலி, கன்றுதல் அல்லது எரிச்சல் உணர்வு தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். மாசடைந்த ஆடைகளைத் தனியாக நிறைய சோப்பு போட்டு துவைத்து உலர்த்திய பிறகே அவைகளை மறு உபயோகம் செய்ய வேண்டும். உடனடியாக டாக்டரை அழையுங்கள். **கண்களில் மருந்து தெளித்திருந்தால்:** தொடர்ந்து 15 நிமிட நேரத்திற்கு கண்களில் தண்ணீரை அறைந்து சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். வலி, எரிச்சல் உணர்வு, கன்றுதல் அல்லது ஒளியச்சம் சகியாமை தொடர்ந்திருந்தால். கண் மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும். உடனடியாக டாக்டரை அழையுங்கள்.

நச்சுமுறிவு: வைட்டமின் கே 1 (பைட்டோமினாடியோன்) இன் நரம்பு ஊசி (2 முதல் 5 மி.கி./கி.கி உடல் எடை) போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். மருத்துவ அறிகுறிகள், சூழ்நிலை நிலவரம் மற்றும் ஆய்வக பரிசோதனைகள் அடிப்படையில் நோயின் தன்மையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். குறிப்பாக மருத்துவ அறிகுறிகள் குறைவாக இருக்கும் போது புரோத்ரோம்பின் நேரத்தை அளவிட கூமரின் ஆன்டிகோயகுலன்ட் விளைவைக் கவனிக்க வேண்டும். புரோத்ரோம்பின் நேரத்தை அதிகரிக்க கூமரின் ஆன்டிகோயகுலன்ட் உதவுவதுடன் சிகிச்சை பலனளித்து நோயாளி இயல்பு நிலைக்கு விரைந்து திரும்ப உதவும்.

சிகிச்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாகவும், நச்சு முறிவு சிகிச்சை முடிந்த பிறகும் புரோத்ரோம்பின் நேர சோதனையை முடிந்த வரையில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. எலிக்கொல்லி மருந்தைப் பயன்படுத்தும் காலத்தில் அடிக்கடி அப்பகுதியைச் சுற்றிப்பார்த்து இறந்துபோயிருக்கும் எலிகளை அகற்றிவிட வேண்டும், அதனால் அவற்றை உணவாக உட்கொள்ளும் மற்ற உயிரினங்களை அண்டாமல் இருக்கச் செய்யலாம். 2. லேபில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது. 3. எலிக்கொல்லிகள் மற்றும் இறந்த எலிகள் பாலூட்டிகளைக் கவர்ந்திழுக்கும் என்பதால் இவை வீட்டு விலங்குகளுக்கும், வனவிலங்குகளுக்கும் ஆபாத்தானவை. 4. நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இத் தயாரிப்பு கொடிய நஞ்சாக இருக்கும் என்பதால், மீன்வளர்ப்பு இடக்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

உற்பத்தியாளர்கள்: பிஏஎஸ்எஃப் பிஎல்சி, செயின்ட் மைக்கேல்'ஸ் இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட் விட்னெஸ், சிஷைர், WA8 8TJ, யுனைடெட் கிங்டம்.

இறக்குமதி செய்து மறு பேக்கிங்கில் செய்பவர்கள்: பிஏஎஸ்எஃப் இந்தியா லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: யூனிட் எண். 10ஏ, 10பி & 10சி (பார்ட்), 10வது மாடி, கோத்ரெஜ் ஒன், பிரோஜ்ஷா நகர், ஈஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, விக்கிரோலி (கிழக்கு), மும்பை - 400 079, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

தொழிற்சாலை: யூனிட் நம்பர் 4, வில்லேஜ் நிம்புவா, போஸ்ட் முபாரக்பூர், டேரா பஸி தாலுகா, மொகாலி மாவட்டம், பஞ்சாப்- 140201.

Tamil

استعمال کے پہلے ہدایت کی پرچی پڑھ لیں

فلوکومافین 0.005% بلاک بیٹ

اِسٹارم™ 0.005% بی‌بی

(چوہے مار دوا)

صرف درآمد کے لئے

صرف حشرات پر قابو پانے والے آپریٹرز (پی سی او) کے استعمال کے لئے

فلوکومافین 0.005% بلاک بیٹ (بی بی) ایک طاقتور ایک مرتبہ دی جانے والی اینٹی کوایگولنٹ ہے جو کھیت اور ذخیرہ اندوزی کی جگہوں میں چوہوں کی متعدد اقسام کے خلاف موثر ہے۔

کیمیائی اجزاء:

نمبرشمار	اجزاء	وزن (جی/ایل)
.1	فلوکومافین اے.آئی.	0.005
.2	ڈینا ٹونیم بینزویٹ	0.001
.3	ایریوگلاوسین ڈائی سوڈیم سالٹ	0.025
.4	اینہائیڈروس سائٹرک ایسڈ	0.5
.5	آرتھو-فینیل فینول	0.05
.6	امورفوس سلیکا	0.0507
.7	سوڈیم کلورائیڈ	0.369
.8	الفا کاپر فیتھلوکیانائن	0.1
.9	ویکس پاؤڈر	24.98
.10	گندم کا آٹا	36.98
.11	گندم کا ٹکڑا	حسب مقدار
	کل	100.00

چھڑکاؤ

استعمال	عام حشرات	مقدار				انتظار کا وقفہ (دنوں میں)
		اے.آئی (ملی گرام)	فارمولیشن (گرام)	استعمال کا طریقہ	پانی (لیٹر)	
کھیت، ذخیرہ اندوزی کی جگہوں، اور چاول، سویابین اور ناریل جیسی فصلوں میں چوہوں پر قابو پانے کے لئے،	(رٹس رٹس، بینڈیکوٹا بنگالینس، ٹیٹرا انڈیکا اور مس مسکلوس)	0.75-1.0	15-20	بیٹ اسٹیشن یا فعال بلوں میں 5-10 میٹر کے وقفے پر۔ اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو 14 دن کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں

ہدایات برائے استعمال اور سفارش: جب بیٹ کو فعال بلوں میں نہیں رکھا جاتا ہے تو ٹن یا مٹی کے برتن، بانس، ناریل یا مقامی طور پر دستیاب کسی بھی دوسرے مٹیریل سے بنے بیٹ اسٹیشنوں کا استعمال کریں۔ فلوکومافین 0.005% بی‌بی ایک بی فیڈ کے بعد چوہوں کی اقسام کو مار دے گا۔ یہ استعمال کے لئے تیار ہے اور اسے دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے اضافے سے پتلا نہیں کرنا چاہئے۔

ہدایات برائے استعمال اور پودوں کی حفاظت کے آلات: متاثرہ علاقوں میں ہاتھ سے استعمال۔ جب بیٹ کو فعال بلوں میں نہیں رکھا جاتا ہے تو ٹن یا مٹی کے برتنوں، بانس، ناریل یا کسی بھی دوسرے مقامی طور پر دستیاب مٹیریل سے بنے بیٹ اسٹیشنوں کا استعمال کریں۔ فلوکومافین 0.005% بی‌بی ایک بی فیڈ کے بعد چوہوں کی اقسام کو مار دے گا۔ یہ استعمال کے لئے تیار ہے اور اسے دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے اضافے سے پتلا نہیں کرنا چاہئے۔

استعمال کا وقت اور فصل کا مرحلہ: متاثرہ علاقوں میں ہاتھ سے استعمال

موسمی حالات: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

مٹی: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

چھڑکاؤ کی تکنیک، آلات کی قسم، نوزل کی قسم: متاثرہ علاقوں میں ہاتھ سے استعمال

مقدار: بیٹ اسٹیشن یا فعال بل میں 5-10 میٹر کے وقفے سے 15-20 گرام فارمولیشن کا استعمال کریں۔ اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو 14 دن کے بعد استعمال کو دہرائیں۔

دوا مکس کرنے کے لئے ہدایات: جب بیٹ کو فعال بلوں میں نہیں رکھا جاتا ہے تو ٹن یا مٹی کے برتنوں، بانس، ناریل یا کسی اور مقامی طور پر دستیاب مٹیریل سے بنے بیٹ اسٹیشنوں کا استعمال کریں۔

دوبارہ چھڑکاؤ کی مدت: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

پی‌ایچ‌آئی: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

چھڑکاؤ کا وقت: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

تواتر اور زیادہ سے زیادہ چھڑکاؤ کی تعداد: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

وہ مراحل جن کے دوران کسی بھی فصل پر چوہے مار دوا کا چھڑکاؤ نہیں کرنا چاہئے: قابل اطلاق نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹ اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

دیگر نباتات کے لئے نقصان: یہ دوا دیگر نباتات کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔

ذخیرہ اندوزی: بیٹ کو اس کے اصلی لیبل والے کنٹینر میں محفوظ جگہ پر رکھیں۔ چوہے مار دوا کی مقدار اور نوعیت کے مطابق دوا کے ڈبوں کو ایسے کمرے یا جگہوں جہاں دوسری چیزیں خصوصاً غذا ذخیرہ کی جاتی ہوں ان سے دور چوہے مار دوا کو دوسرے کمرے یا جگہ پر یا پھر الماری میں تالا لگا کر رکھیں۔ 2. چوہے مار دوا کو ذخیرہ کرکے رکھنے کیلئے بنائے گئے احاطے یا کمروں کو اچھی تعمیرشدہ، سوکھی، روشن، ہوا دار اور کشادہ ہونا چاہئے تا کہ یہ مرطوب ہوا سے خراب نہ ہو جائیں۔

احتیاطی تدابیر: 1. چوہوں کے لئے بیٹ اور مردہ چوہے، پستانیہ جانوروں کے لئے پرکشش ہوسکتے ہیں اور اس لئے پالتو جانوروں اور جنگلی جانوروں کے لئے خطرناک ہیں۔ یہ پروڈکٹ مچھلی اور آبی غیر فقری جانوروں کے لئے زہریلا اثر رکھتی ہے اور اس لئے اس پروڈکٹ کو آبی جانداروں کی افزائش کے تالابوں کے قریب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 2. منہ سے رابطے سے گریز کریں۔ کام کے بعد اور کھانے، پینے اور سگریٹ نوشی سے پہلے اپنے ہاتھوں اور کھلی جلد کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3. بچوں، پرندوں اور گھریلو جانوروں، خاص طور پر بلیوں، کتوں اور مرغیوں کی بیٹ تک رسائی کو روکیں۔ 4. ایسی جگہوں پر استعمال نہ کریں جہاں کھانا، چارہ یا پانی آلودہ ہو سکتا ہے۔ 5. تمام چوہوں کی لاشیں جلا دیں۔ انہیں کچرہ دانوں یا کچرے کی جگہوں پر نہ ڈالیں۔

دوا کے استعمال شدہ ڈبوں کو تلف کرنا: 1. دوا کو تیار کرنے والے، حشرات کش ادویات کے فارمیولیٹروں اور آپریٹرز کا فرض ہوگا کہ وہ اضافی اجزاء اور دھوئے ہوئے پانی اور دوا کے خالی ڈبوں کو محفوظ طریقے سے ضائع کریں تاکہ ماحولیاتی اور آبی آلودگی کو روکا جاسکے۔ 2. دوا کے استعمال شدہ ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں تا کہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہوسکے۔ 3. خالی ڈبوں کو توڑ کر اور انہیں آبادی سے دور گاڑ دیں۔

زہر خوراکی کی علامات: کبھی کبھار ناک یا منہ سے خون بہنے ، فضلہ یا پیشاب میں خون، معمولی زخم یا کھرچنے سے ضرورت سے زیادہ خون بہنا، سانس لینے میں دشواری، منہ پیلا پڑنا اور ٹھنڈے مسوڑھوں، تھکن کا احساس، عمومی کمزوری، جلد کے نیچے ورم، یہ ورم ہڈی کے جوڑوں کے ارد گرد تو اس سے لنگڑا پن ہوسکتا ہے۔

ابتدائی طبی مدد : اگر دوا کھا لی جائے: اگر شخص ہوش میں ہے اور پوری طرح سے ہوشیار ہے تو پانی سے منہ دھوئیں اور 1 یا 2 گلاس پانی پئیں۔ بے ہوش شخص کو منہ سے کچھ نہ کھلائیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور جب تک ڈاکٹر سے رابطہ نہ ہو مریض کو قئے نہ کرائیں۔ ڈاکٹر کو فوراً کال کریں۔ **اگر دوا سانس کے ذریعے داخل ہوجائے :** مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور جسم کے درجۂ حرارت کا خیال رکھیں۔ اگر مریض سانس نہیں لے پا رہا ہو یا اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو تو اسے مصنوعی سانس دیں اور منہ سے سانس لینے کو ترجیح دیں، اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر کو فوراً کال کریں۔ **جلد سے رابطے میں آنے پر:** جسم کے متاثرہ حصوں کے ساتھ بالوں اور ناخنوں کے نیچے کی جگہ کو صابن اور کافی مقدار میں پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ اگر درد، سرخی یا سوزش باقی رہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تمام آلودہ کپڑوں کو علیحدہ کرکے اسے دوبارہ استعمال سے پہلے صابن اور ڈھیر سارے پانی سے علیحدہ دھوئیں۔ ڈاکٹر کو فوراً کال کریں۔ **آنکھوں سے دوا مَس ہو جانے کی صورت میں :** کم از کم 15 منٹ تک وافر مقدار میں آنکھوں کو پانی سے آہستہ آہستہ دھو لیں۔ اگر درد، جلن، سرخی یا فوٹو فوبیا بر قرار رہے تو آنکھوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر کو فوراً کال کریں۔

تریاق: وٹامن کے1 (فائیٹومینا ڈیون) کا رگوں میں انجکشن (2 سے 5 ملی گرام / کلوگرام جسمانی وزن)۔ تشخیص طبی علامات ، حالات کے شواہد اور لیبارٹری ٹیسٹوں پر مبنی ہے۔ کوما رین اینٹی کوایگولنٹ اثر کا ایک قابل اعتماد اشارہ، خاص طور پر اگر طبی علامات کم سے کم ہوں تو پروتھرومبن وقت کا تعین ہے۔ کومارین کے ساتھ اینٹی کوایگولیشن پروتھرومبن کے وقت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور کامیاب علاج اسے جلدی سے معمول کی سطح پر واپس لے جائے گا۔

جہاں بھی ممکن ہو پروتھرومبن ٹائم ٹیسٹنگ کی جانچ کی جانی چاہئے، کم از کم علاج کے آغاز سے پہلے اور تریاق کی دوا بند کرنے کے بعد۔

احتیاطی بیان: 1. مردہ اور قریب المرگ چوہوں کو بار بار تلاش کریں اور ہٹا دیں، اس سے علاج کے دوران شکاری جانور اور مردار کھانے والوں کا انھیں کھانے کا امکان کم ہوجاتا ہے۔ 2. اس لیبل/ہدایت کی پرچی پر درج فصل کے دیگر علاوہ فصل پر اس دوا کا چھڑکاؤ نہ کریں۔ 3. چوہوں کے بیٹ اور مردہ چوہے جانوروں کے لئے پرکشش ہوسکتے ہیں اور اس وجہ سے گھریلو جانوروں اور جنگلی حیات کے لئے کے لئے مضر ہوسکتے ہیں۔ 4. یہ پروڈکٹ مچھلی اور آبی غیر فقری جانوروں کے لئے زہریلا اثر رکھتا ہے اور اس لئے، اس پروڈکٹ کو آبی افزائش کے تالابوں کے قریب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

تیار کردہ بذریعہ: بی اے ایس اے پی ایل سی، سینٹ مائیکل انڈسٹریل اسٹیٹ، وڈنس، چیشائر، ڈبلیو اے8 8ٹی جے، یونائیٹڈ کنگڈم

درآمد اور دوبارہ پیکنگ بذریعہ: بی اے ایس ایف انڈیا لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: یونٹ نمبر 10اے، 10بی اور 10سی (پارٹ)، 10ویں منزل، گودریج وَن، پیروج شاہ نگر، ایسٹرن ایکسپریس ہائی وے، وکھرولی (مشرق)، ممبئی ـ 079 400، مہاراشٹر، بھارت۔

فیکٹری: یونٹ نمبر 4، گاؤں نمبوا، پی او مبارک پور، تحصیل ڈیرہ بسی، ضلع۔ موہالی، پنجاب ـ140201۔

Urdu



Harmful



I215 Purab

Size : 550mm(W)X350mm(H)