Read Leaflet Before Use

Rodenticide

For Import

Storm® 0.005% BB

Flocoumafen 0.005% Block bait For pest control operators (PCO) use only

Purpose: For pest control operators use only. Flocoumafen 0.005% Block bait (BB) is a potent multi feed anticoagulant effective against several species of rats in field crops like Coconut, Rice & Soybean & storage. **Chemical composition :** 1) Flocoumafen a.i. 0.005% (w/w), 2) Denatonium benzoate 0.001% (w/w), 3) Erioglaucine disodium salt 0.025% (w/w), Anhydrous citric acid 0.5% (w/w), Ortho-phenylphenol 0.05 % (w/w), Amorphous silica 0.0507% (w/w), Sodium chloride 0.369 % (w/w), Alpha copper phthalocyanine 0.1 % (w/w), Wax powder 24.98% (w/w), Wheat flour 36.98% (w/w), Cut wheat q.s. Total 100.00% (w/w). **Re-entry:** Not applicable because it is used as bait stations. **Crop and Pest Groups:** Flocoumafen 0.005% Block Bait (BB) is a potent multi feed anticoagulant effective against several species of rats in field crops like Coconut, Rice & Soybean & storage. **Dosage, Direction for use and Manner time application:** Please refer leaflet for details. **Safety Precaution: 1.** Rodenticide baits and dead rodents can be attractive to mammals and are therefore hazardous to domestic animals and to wild life. Product is toxic to fish and aquatic invertebrate and thus the product may not be used near aquaculture. 2. Avoid contact by mouth. Wash your hands and exposed skin with soap and tap water after work and before eating, drinking and smoking. 3. Prevent access to the bait by children, birds and domestic animals, particularly cats, dogs and poultry. 4. Do not use where food, feed or water could become contaminated. 5. Burn all rodent bodies. Do not place them in refuse bins or rubbish tips. **Symptoms of Poisoning, First Aid :** Please refer leaflet for details. **Antidote:** Intravenous injection of Vitamin K1 (Phytomenadione) (2 to 5mg/kg body weight). Diagnosis is based on a combination of clinical signs, circumstantial evidence and laboratory tests. A reliable indication of a coumarin anticoagulant effect, particularly if clinical signs are minimal, is the determination of prothrombin time. Anticoagulation with coumarins leads to an increase in prothrombin time and successful treatment will quickly return it to normal levels. Prothrombin time testing should be carried out wherever possible, atleast before the start of treatment and after antidote is withdrawn. **Cautionary Statement: 1. Search for and remove moribund and dead rodents at frequent intervals during treatment reduces the likelihood of predators and scavengers consuming them. 2. Rodenticide baits and dead rodents can be attractive to mammals and therefore to domestic animals and to wild life. 3. Product is Toxic to Fish and Aquatic Invertebrates and thus the product may not be used near Aquaculture 4. Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflet.**

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले

कृंतकनाशी
आयात के लिए

स्टॉर्म™ 0.005% बीबी

फ्लोकुम्याफेन 0.005% ब्लॉक बेट

केवल पेस्ट नियंत्रण संचालक (पीसीओ) उपयोग के लिए

हेतु: केवल पेस्ट नियंत्रण संचालक उपयोग के लिए फ्लोकुमाफेन 0.005% ब्लॉक बेट एक सक्षम एकल खुराक रक्तदमनरोधी है, जो धंडारण में और फसलों में कैलो-परिएल, धान और सोयाबिन, कई प्रजातियों के चूहों के विरुद्ध प्रभावी है। **रासायनिक घटक :** फ्लोकुमाफेन (सक्रिय सामग्री) 0.005 % (भा/भा), डेनाटोनियम बेंजोएट 0.001 % (भा/भा), एरियोग्लोसिन डायसोडियम साल्ट 0.025 % (भा/भा), एनहाइड्रस साइट्रिक एसिड 0.5% (भा/भा), ऑर्थो-फेनिलफेनोल 0.05% (भा/भा), एमोर्फस सिलिका 0.0507 % (भा/भा), सोडियम क्लोराइड 0.369% (भा/भा), अल्फा कॉपर थालोसाइनाइन 0.1% (भा/भा), मोम का चूरा 24.98% (भा/भा), गेहूँ का आटा 36.98 % (भा/भा), कटा हुआ गेहूँ यथा मात्रा कुल 100 % (भा/भा). **पुन:-प्रवेश:** लागू नहीं, क्योंकि इसका उपयोग चारा स्थलों के रूप में होता है। **मात्रा, प्रयोग का तरीका, प्रयोग का समय:** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें। **मनुष्यों और गंडकजीव समूह :** फ्लोकुमाफेन 0.005% ब्लॉक बेट एक सक्षम एकल खुराक रक्तदमनरोधी है जो भंडारण में और फसलों में कैलो-परिएल, धान और सोयाबिन, कई प्रजातियों के चूहों के विरुद्ध प्रभावी है। **सुरक्षा सावधानियाँ:** १. स्तनधारियों के लिए कृंतक कीटनाशक और मृत कृंतक आकर्षक हो सकते हैं और इसलिए घरेलू पशुओं और जंगली जीवन के लिए खतरनाक हैं। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरुकीय के लिए विषाक्त है और इस प्रकार उत्पाद का उपयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जा सकता है। २. मुँह से किसी भी संपर्क से बचें। काम करने के बाद एवं खाने, पीने एवं धूम्रपान करने से पहले अपने हाथों एवं संपर्क में आई त्वचा को साबुन व नल के पानी से अच्छी तरह से धोएँ। ३. बेट को बच्चों, चिड़ियों एवं घरेलू जानवरों, खासतौर पर बिल्लियों, कुत्तों एवं मुर्गी-मुर्गियों की पहुँच से दूर रखें। ४. इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर न करें, जहाँ भोजन या पानी दूसरे दूषित हो सकता हो। ५. चूहों के शवों को जलाएँ। उन्हें कचरे के डिब्बों या गड्ढों में न डालें। **विषाक्तता के लक्षण, प्रथमोपचार:** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें। **विष निवारण:** विटामिन के-1 (फाइटोमेनाडियोन) का अंतःशिरीय इंजेक्शन (2 से 5 मि.ग्रा./कि.ग्रा. शरीरिक वजन). निदान नैदानिक संकेतों, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रयोगशाला परीक्षणों के संयोजन पर आधारित है। एक कार्डबमिन एंटीकोआगुलेंट प्रभाव का एक विश्वसनीय संकेत, खासकर अगर नैदानिक संकेत कम संकेत हैं, प्रोथ्रोम्बिन समय का निर्धारण। वाइफारिन के साथ एंटीकोआगुलेशन प्रोथ्रोम्बिन समय में वृद्धि की ओर जाता है और सफल उपचार जल्दी से सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन समय परीक्षण जहाँ भी संभव हो, इलाज शुरू होने से पहले और एंटीडोट के बाद वापस ले लिया जाना चाहिए। **चेतावनी: 1.उपयोग के दौरान थोड़े थोड़े समय में मरणासन्न एवं मृत जन्तुओं को ढूँढ़े और हटाएँ, इससे परभक्षियों और मुर्दाखोरों द्वारा उनका उपभोग करने की संभावना कम होती है। स्तनधारियों के लिए कृंतक कीटकनाशक और मृत कृंतक आकर्षक हो सकते हैं और इसलिए घरेलू पशुओं और जंगली जीवन के लिए खतरनाक हैं। 3.उत्पाद मछली और जलीय अकशेरुकीय के लिए विषाक्त है और इस प्रकार उत्पाद का उपयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जा सकता है। 4.लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।**

BASF
We create chemistry

Storm® 0.005% BB

Flocoumafen 0.005% Block bait

Rodenticide

Dangerous to use empty containers.
Destroy Container after use as directed on leaflet.

खाली डब्बों का प्रयोग खतरनाक है। प्रयोग के तुरंत बाद डब्बों को लीफलेट में दिए गये निर्देशानुसार नष्ट कर दें।

POISON

11213 Alpine

Keep away from heat & open flame.
Keep out of the reach of children.
If ingested call the doctor immediately.

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। अगर मुहँ के द्वारा सेवन किए जाने की स्थिति में डॉक्टर को बुलाएँ।

® = Registered Trademark of BASF Group Company
TM = Trademark of BASF Group Company
® = बीएएसएफ़ ग्रुप कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क
TM = बीएएसएफ़ ग्रुप कंपनी का ट्रेडमार्क

Manufactured by: BASF plc, St. Michael's Industrial Estate, Widnes, Cheshire, WA8 8TJ, United Kingdom.
Imported and re-packed by: BASF India Limited, Registered office : Unit No.10A, 10B & 10C (Part), 10th Floor, Godrej one, Pirojsha Nagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai – 400 079, Maharashtra, India. **Factory:** Unit No. 4 ,Village Nimbua, P.O Mubarakpur, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab-140201.
निर्माता: बीएएसएफ़ पीएलसी, सेंट माइकलस इंडस्ट्रियल एस्टेट, विडनेस, चेशैर, डब्ल्यूए८ ८टीजे, यूनाइटेड किंगडम. **आयात और पुन:पैकिंगकर्ता: बीएएसएफ़ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय :** यूनिट नं. 10ए, 10बी और 10सी (पार्ट), 10वीं मंजिल, गोदरेज वन, पिरोजशा नगर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, विक्रोली (पूर्व), मुंबई – 400 079, महाराष्ट्र, भारत. **फैक्टरी:** यूनिट नं. 4, ग्राम निम्बुआ, पो. ऑ. मुबारकपुर तहसील देरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब-140 201
Consumer care cell : Contact at registered office of BASF India Limited, Tel. (0)7415002222, E-mail : consumersgro-india@basf.com

EPR. Regn. No. BO-24-000-05-AAACB4599E-22
Regn. No./ रजि. नं.: **CIR-2306/2020(424)- Flocoumafen (BB)-01**
Mfg Lic. No. / उ.आ.नं.: **LCPP/ADO-Mfg. 12/837**

Lot No.: / लॉट नं.:
Mfg.Date: / उत्पादन तिथि:
Expiry Date: / नियमावली होने का तिथि:
Maximum Retail Price: ₹.
(Inclusive of all taxes)
अधिकतम खुदरा मूल्य: ₹.
(सभी करों सहित)
Net Quantity / शुद्ध मात्रा:
Website / वेबसाईट : https://crop-protection.basf.in/en

Size :250mm(W) X 125mm(H)